NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 07/10/2022

Dénomination du médicament

CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral ?
3. Comment prendre CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide ORAL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicament homéopathique
CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé pour réduire la nervosité notamment en cas de palpitations et de troubles du sommeil après avoir écarté toute maladie cardiaque.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral ?

N'utilisez jamais CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral :

- Chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

- Ce médicament contient 87 mg d'alcool (éthanol) pour 10 gouttes, équivalent à 55% V/V. La quantité dans 10 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 3 ml de bière ou 1 ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable.

- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les femmes enceintes ou allaitant et les enfants.

- En cas d'utilisation répétée, la durée maximale totale de traitement devra être limitée à 6 mois

Enfants

Sans objet

Autres médicaments et CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral contient de l'éthanol (10 gouttes contiennent 87 mg d'éthanol).

3. COMMENT PRENDRE CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Médicament réservé à l'adulte.

Posologie

A l'aide de la seringue graduée, prendre 10 gouttes 3 fois par jour, sans dépasser 35 gouttes par jour, à diluer dans un peu d'eau. Ne pas dépasser la dose maximale recommandée.

Espacez les prises dès amélioration et cessez les prises dès la disparition des symptômes.

Mode d'administration

Voie orale.

Durée du traitement

La durée du traitement ne doit pas dépasser 1 mois.

L'absence d'amélioration au bout de 10 jours doit amener à consulter un médecin.

Si vous avez pris plus de CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral que vous n'auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide ORAL ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ce médicament doit être utilisé au maximum 1 mois après première ouverture.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral

La substance active est :

Crataegus oxyacantha teinture mère.

Les autres composants sont :

Ethanol à 96 pour cent *V/V*, eau purifiée.

Qu'est-ce que CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON, liquide oral et contenu de l'emballage extérieur

CRATAEGUS OXYACANTHA TEINTURE MERE BOIRON est un liquide oral, conditionné en flacon de 125 mL, avec une seringue graduée pour administration orale.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

BOIRON
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY
FRANCE

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

BOIRON
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY
FRANCE

Fabricant

BOIRON
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY
FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).