

VIDAL DE LA FAMILLE

ALOPLASTINE

Fiche révisée le : 03/11/2020

Protecteur cutané

oxyde de zinc, glycérol, talc

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p 100 g
Oxyde de zinc	25 g
Glycérol	20 g
Talc	25 g
Alcools stéarylique et cétylique	+

INDICATIONS

C'est une pâte non grasse protectrice qui contient de l'oxyde de zinc.
Elle est utilisée pour traiter les irritations de la peau, notamment la rougeur des fesses du [nourrisson](#).

CONTRE-INDICATIONS

Cette pâte ne doit pas être appliquée sur des lésions infectées.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament contient des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas sans l'avis préalable de votre pharmacien ou de votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Appliquer une couche épaisse sur la zone à traiter.

Posologie usuelle:

1 application, matin et soir, ou plus si nécessaire.

CONSEILS

La rougeur des fesses du [nourrisson](#) est souvent due à l'imprégnation de la peau par l'urine, sous la couche. Il est donc nécessaire de nettoyer et de rincer abondamment la peau avec de l'eau avant d'appliquer le médicament.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Réaction au site d'application de type irritation, sensation de brûlure, [eczéma](#), rougeur, douleur, démangeaisons, éruption cutanée et urticaire.

LEXIQUE

eczéma

Maladie de la peau se manifestant par des boutons et de vives démangeaisons. L'eczéma peut être dû au contact avec une substance allergisante (eczéma de contact) ou être lié à une prédisposition génétique (eczéma atopique).

nourrisson

Enfant de un à 30 mois. Un enfant de moins de un mois est un nouveau-né.