

VIDAL DE LA FAMILLE

COCCULINE

Fiche révisée le : 02/01/2020

Homéopathie

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p cp	p dose
Cocculus indicus 4 CH	0,625 mg	0,0025 ml
Tabacum 4 CH	0,625 mg	0,0025 ml
Nux vomica 4 CH	0,625 mg	0,0025 ml
Petroleum 4 CH	0,625 mg	0,0025 ml
Lactose	+	+
Saccharose		+

INDICATIONS

Ce médicament est un [complexe](#) (association) de composants homéopathiques.

Il est traditionnellement utilisé dans le [traitement homéopathique](#) des nausées et les vomissements sans fièvre ou du mal des transports.

ATTENTION

Ne donnez pas ce médicament pour traiter les nausées ou les vomissements chez un enfant de moins de 6 ans sans avis médical.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament peut être pris pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas de façon prolongée sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacie.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Les comprimés sont à sucer et les granules sont à laisser fondre sous la langue.

Pour les enfants de 18 mois à 6 ans, les comprimés et les granules doivent être dissous dans un peu d'eau avant la prise.

Posologie usuelle:

Dans les nausées et les vomissements sans fièvre :

- Adulte et enfant de plus de 18 mois : 1 comprimé à sucer ou 1 dose de granules dès l'apparition des symptômes, à renouveler si nécessaire, sans dépasser 6 comprimés ou 3 doses par jour. La durée du traitement doit être limitée à 48 heures sans avis médical.

Dans le mal des transports :

Comprimé :

- Adulte : 2 comprimés 3 fois par jour, à prendre la veille et le jour du voyage. 2 comprimés dès l'apparition des symptômes pendant le voyage, à renouveler si nécessaire. Ne pas dépasser 6 comprimés par jour.
- Enfant de plus de 18 mois : 1 comprimé 3 fois par jour, à prendre la veille et le jour du voyage. 1 comprimé dès l'apparition des symptômes pendant le voyage, à renouveler si nécessaire.

Granules :

- Adulte et enfant de plus de 18 mois : 1 dose de granules la veille du voyage et juste avant le départ. Pendant le voyage, 1 dose de granules dès l'apparition des symptômes, à renouveler si nécessaire.

CONSEILS

Abstenez-vous de manger dans le quart d'heure qui précède ou suit la prise.

Il existe une série de mesures simples et souvent efficaces pour prévenir le mal des transports :

- bien dormir la veille de votre voyage ;
- manger légèrement mais régulièrement pendant le trajet, en privilégiant les aliments solides ;
- ne pas consommer de café, ni de boissons alcoolisées ou gazeuses ;
- éviter les odeurs de cuisine ou de tabac ;
- s'abstenir de lire ;
- privilégier certaines places : passager avant en voiture, au niveau des ailes en avion, sur le pont au centre en bateau.

LEXIQUE

complexe

Nom donné à une association de plusieurs remèdes homéopathiques. En général, les dilutions employées sont basses : de 3 DH (décimale hahnemannienne) à 6 CH (centésimale hahnemannienne).

orodispersible

Qualifie un comprimé qui se désagrège dans la bouche au contact de la salive. Il peut également être dispersé dans un verre d'eau avant ingestion.

traitement homéopathique

Traitement basé sur l'administration de substances fortement diluées d'origine végétale, animale ou minérale. Les grands principes de l'homéopathie sont la similitude (utilisation de substances produisant des effets semblables aux symptômes de la maladie), la dilution infinitésimale (les substances utilisées font l'objet de multiples dilutions) et la globalité (la cible du traitement n'est pas un organe en particulier, mais l'individu dans son ensemble).