

VIDAL DE LA FAMILLE

DÉFLAMOL

Fiche révisée le : 06/02/2007

Protecteur cutané

dioxyde de titane, oxyde de zinc

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p 100 g
Dioxyde de titane	4,5 g
Oxyde de zinc	3,5 g
Lanoline	+

INDICATIONS

C'est une pommade protectrice qui contient de l'oxyde de zinc.

Elle est utilisée pour traiter les irritations de la peau, notamment la rougeur des fesses du [nourrisson](#).

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- [allergie](#) à la lanoline,
- sur des lésions suintantes ou infectées.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament contient des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas sans l'avis préalable de votre pharmacien ou de votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Nettoyer la région à traiter avant l'application. Appliquer une couche mince et masser pour faire pénétrer la pommade.

Posologie usuelle:

1 application, plusieurs fois par jour.

CONSEILS

La rougeur des fesses du [nourrisson](#) est souvent due à l'imprégnation de la peau par l'urine, sous la couche. Il est donc nécessaire de

nettoyer et de rincer abondamment la peau avec de l'eau avant d'appliquer le médicament.

LEXIQUE

allergie

Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.

nourrisson

Enfant de un à 30 mois. Un enfant de moins de un mois est un nouveau-né.