VIDAL DE LA FAMILLE

H.E.C. dermique et nasale

Fiche révisée le : 01/09/1999

Protecteur cutané

tanin, hamamélis, phénazone

.Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie.Effets indésirables.Lexique

COMPOSITION

	p 100 g
Tanin officinal	12,50 g
Hamamélis, extrait fluide	0,75 g
Phénazone	0,75 g
Lanoline	+
Baume du Pérou	+

INDICATIONS

C'est une pommade aux multiples propriétés : elle est hémostatique, protectrice et calmante.
Elle est utilisée dans le traitement d'appoint des brûlures superficielles et des saignements de nez.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- allergie aux pyrazolés, au baume du Pérou ou à la lanoline ;
- lésion infectée.

ATTENTION

Évitez l'usage prolongé de ce médicament, notamment chez l'enfant, sur des surfaces étendues ou profondément lésées, sans l'avis de votre médecin : risque de passage du médicament dans le sang.
La peau ou la muqueuse doit être bien nettoyée avant l'application.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

La pommade peut être appliquée soit directement sur la surface à traiter, soit à l'aide d'une mèche de gaze à l'intérieur du nez.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Eczéma de contact (lanoline, baume du Pérou).

LEXIQUE

allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.

Eczéma
Maladie de la peau se manifestant par des boutons et de vives démangeaisons. L'eczéma peut être dû au contact avec une substance allergisante (eczéma de contact) ou être lié à une prédisposition génétique (eczéma atopique).

hémostatique
Médicament d'usage local qui arrête les saignements.

muqueuse
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).

traitement d'appoint
Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.