

VIDAL DE LA FAMILLE

MICROLAX

Fiche révisée le : 06/09/2019

Laxatif par voie rectale

sorbitol, citrate de sodium, laurylsulfoacétate de sodium

[.Présentations.](#) [Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION [\(sommaire\)](#)

	p unidose	p unidose Bébé
Sorbitol (solution à 70 %)	4,465 g	2,679 g
Citrate de sodium	450 mg	270 mg
Laurylsulfoacétate de sodium	64,5 mg	38,7 mg

INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Ce médicament est un laxatif administré par [voie](#) rectale. Il ramollit les selles et déclenche une contraction du rectum qui permet leur évacuation.

Il est utilisé dans le traitement de la [constipation](#).

La solution Bébé est également utilisée pour préparer le rectum avant certains examens.

CONTRE-INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de douleurs abdominales de cause inconnue ou de maladie inflammatoire du côlon.

ATTENTION [\(sommaire\)](#)

Les laxatifs administrés par [voie](#) rectale ne doivent pas être utilisés de façon prolongée sans avis médical : ils risquent d'empêcher le réflexe normal d'expulsion des selles.

Des précautions sont nécessaires chez la personne atteinte d'[hémorroïdes](#), de [fissure anale](#) ou de [rectocolite hémorragique](#).

GROSSESSE et ALLAITEMENT ([sommaire](#))

Ce médicament peut être utilisé de façon ponctuelle pour traiter la constipation de la femme enceinte ou qui allaite.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE ([sommaire](#))

Introduire la canule dans le rectum et vider le contenu de l'unidose par pression. Retirer la canule sans relâcher la pression sur le tube. L'effet laxatif se manifeste après un délai de 5 à 20 minutes.

Posologie usuelle:

- Adulte : 1 unidose de **MICROLAX** par jour en cas de constipation.
- Enfant et nourrisson : 1 unidose de **MICROLAX BÉBÉ** par jour en cas de constipation ou 1 unidose 5 à 20 minutes avant l'heure choisie pour la selle en cas de préparation à un examen du rectum.

CONSEILS ([sommaire](#))

Le traitement de la constipation repose essentiellement sur des mesures hygiéno-diététiques : alimentation riche en fibres, eau de boisson riche en magnésium, activité physique régulière et amélioration de la position sur les toilettes.

La boîte de 4 récipients unidoses Adulte peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES ([sommaire](#))

Un usage prolongé peut occasionner des sensations de brûlure anale et exceptionnellement des [inflammations](#) du rectum.

LEXIQUE ([sommaire](#))

constipation

Ralentissement du transit intestinal se traduisant par la raréfaction des selles.

diarrhée

Aussi appelée turista, cette diarrhée, généralement bénigne, est due à des bactéries et peut être contractée lors d'un voyage à l'étranger, avant que l'organisme se soit habitué aux germes présents dans l'environnement local.

fissure anale

Petite crevasse du pourtour de l'anus, souvent peu ou pas visible, provoquant des douleurs vives pendant et après la selle.

hémorroïdes

Dilatation anormale d'une veine de l'anus ou du rectum se développant soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Elle peut être à l'origine d'un saignement.

inflammations

Réaction naturelle de l'organisme contre un élément reconnu comme étranger. Elle se manifeste localement par une rougeur, une chaleur, une douleur ou un gonflement.

rectocolite hémorragique

Maladie inflammatoire du rectum et du côlon, qui évolue par poussées. Chaque poussée s'accompagne de fièvre, de selles glaireuses et sanglantes.

voie

- Chemin (voie d'administration) utilisé pour administrer les médicaments : voie orale, sublinguale, sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, intradermique, transdermique.
- Ensemble d'organes creux permettant le passage de l'air (voies respiratoires), des aliments (voies digestives), des urines (voies urinaires), de la bile (voies biliaires), etc.