

VIDAL DE LA FAMILLE

SORBITOL DELALANDE

Fiche révisée le : 11/07/2023

Laxatif osmotique

[.Présentations.](#) [Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Interactions médicamenteuses.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION [\(sommaire\)](#)

	p sachet
Sorbitol	5 g

INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Ce médicament est un [laxatif osmotique](#). Il attire l'eau dans l'intestin et augmente le volume des selles. Il facilite également la digestion en favorisant la sécrétion de la bile dans l'intestin par vidange de la vésicule biliaire. Il est utilisé dans le traitement de la constipation et dans le [traitement d'appoint](#) des digestions difficiles.

CONTRE-INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- maladie inflammatoire du côlon,
- occlusion intestinale ou risque d'occlusion,
- douleurs abdominales de cause inconnue,
- obstruction des [voies biliaires](#),
- [insuffisance hépatique](#) grave.

ATTENTION [\(sommaire\)](#)

En cas de constipation inexpiquée par le changement de mode de vie, de douleurs abdominales répétitives ou prolongées, de vomissements ou de diarrhée, ce médicament ne doit pas être pris sans avis médical. Il est nécessaire de boire beaucoup d'eau, particulièrement en cas de dilatation du côlon, d'alitement et chez la personne âgée.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES [\(sommaire\)](#)

Ce médicament peut interagir avec les médicaments contenant une résine échangeuse d'ions (**KAYEXALATE**, **RESIKALI**).

GROSSESSE et ALLAITEMENT [\(sommaire\)](#)

Ce médicament contient des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas sans l'avis préalable de votre pharmacien ou de votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE [\(sommaire\)](#)

Le contenu des sachets doit être dissous dans un demi-verre d'eau.
Chez les personnes atteintes de colite, le médicament doit être pris de préférence après les repas.

Posologie usuelle:

- Adulte :
 - Constipation : 1 sachet le matin à jeun ;
 - Digestion difficile, ballonnement : 1 à 3 sachets par jour, avant les repas ou au moment des troubles.

La durée du traitement doit être limitée à une semaine sans avis médical.

CONSEILS [\(sommaire\)](#)

Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre pharmacien.

Le traitement de la constipation repose essentiellement sur des mesures hygiénodététiques : alimentation riche en fibres, eau de boisson riche en magnésium, activité physique régulière et amélioration de la position sur les toilettes.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES [\(sommaire\)](#)

Diarrhée, douleurs abdominales, sensation de ballonnement.

LEXIQUE [\(sommaire\)](#)

insuffisance hépatique

Incapacité du foie à remplir sa fonction, qui est essentiellement l'élimination de certains déchets, mais également la synthèse de nombreuses substances biologiques indispensables à l'organisme : albumine, cholestérol et facteurs de la coagulation (vitamine K, etc.).

laxatif osmotique

Laxatif permettant de rendre les selles plus liquides en retenant l'eau dans le contenu de l'intestin. Il est dénué de toxicité.

traitement d'appoint

Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.

voies biliaires

Voies excrétrices conduisant la bile du foie au duodénum. Elles comprennent le canal cholédoque et la vésicule biliaire, réservoir qui stocke la bile en excès entre les repas.

