

VIDAL DE LA FAMILLE

DIFRAREL E

Fiche révisée le : 28/09/2009

Vasculoprotecteur

myrtille, vitamine E

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p cp
Myrtille, extrait anthocyanosidique	50 mg
Alpha-tocophérol (Vitamine E)	50 mg

INDICATIONS

Ce médicament associe un extrait de plante qui a un effet protecteur sur les vaisseaux sanguins et de la vitamine E. Il est utilisé dans le [traitement d'appoint](#) de la myopie ou des troubles de la vision nocturne.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

Posologie usuelle:

3 à 6 comprimés par jour, 20 jours par mois.

LEXIQUE

traitement d'appoint

Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.