

# VIDAL DE LA FAMILLE

## OPTICRON

Fiche révisée le : 03/02/2023

### Collyre antiallergique

cromoglicate de sodium

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Interactions médicamenteuses.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#)  
[Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

### COMPOSITION

	flacon p 100 ml	unidose p 100 ml
Cromoglicate de sodium	2 g	2 g
Benzalkonium chlorure	+	

### INDICATIONS

Ce collyre contient un antiallergique local.  
Il est utilisé dans le [traitement symptomatique](#) des [allergies](#) oculaires.

### ATTENTION

Ce médicament peut être obtenu sans ordonnance ; néanmoins, un avis médical est nécessaire avant de l'utiliser chez l'enfant. De même, en cas de persistance des [symptômes](#), consultez votre médecin.

Le flacon de 10 ml contient un conservateur (chlorure de benzalkonium) qui peut décolorer les lentilles de contact souples : il est recommandé d'ôter les lentilles de contact avant l'instillation et d'attendre 15 minutes avant de les remettre.

Conducteur : l'instillation de ce collyre peut provoquer une gêne visuelle transitoire.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce collyre peut interagir avec d'autres collyres : respectez un intervalle de 15 minutes entre deux instillations.

### GROSSESSE et ALLAITEMENT

Compte tenu du très faible passage du médicament dans le sang, ce collyre peut être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement.

### MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Tirer la paupière inférieure vers le bas tout en regardant vers le haut et déposer une goutte de collyre entre la paupière et le globe oculaire ([cul-de-sac conjonctival](#)).

## Posologie usuelle:

- Adulte et enfant : 1 goutte, 2 à 6 fois par jour, à intervalles réguliers.

## CONSEILS

Veillez à ne pas mettre en contact l'embout du flacon avec l'œil ou les doigts pour éviter de contaminer le collyre avec les germes présents sur les paupières ou la peau.

L'application correcte du produit peut nécessiter une aide.

Le flacon de 5 ml doit être conservé à l'abri de la lumière, maximum 15 jours après ouverture. Les unidoses sont sans conservateurs ; elles doivent être jetées après l'instillation des gouttes.

## EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Sensation passagère de picotements et de brûlure après instillation.

[Réaction allergique.](#)

---

## LEXIQUE

### ***allergies***

Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.

### ***cul-de-sac conjonctival***

Espace formé lorsqu'on tire vers le bas la paupière inférieure, qui se décolle de l'œil et forme une cavité. C'est dans celle-ci que doivent être déposées les gouttes de collyre et les pommades ophtalmiques. Le médicament se répartit naturellement sur la totalité de l'œil. Il sera éliminé, comme les larmes, par le canal lacrymal, qui évacue les larmes vers le nez.

### ***Réaction allergique***

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

### ***symptômes***

Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.

### ***traitement symptomatique***

Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.