

VIDAL DE LA FAMILLE

SENSIVISION AU PLANTAIN

Fiche révisée le : 11/12/2009

Collyre adoucissant

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p 100 ml
Plantain lancéolé, extrait de feuille	2 g

INDICATIONS

Ce collyre contient un extrait de plante.
Il est traditionnellement utilisé en cas d'irritation de l'œil ou de gêne oculaire.

ATTENTION

Une irritation oculaire peut être due à une infection : en cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Tirer la paupière inférieure vers le bas tout en regardant vers le haut et déposer les gouttes de collyre entre la paupière et le globe oculaire ([cul-de-sac conjonctival](#)).

Posologie usuelle:

1 ou 2 gouttes, 2 à 4 fois par jour.

CONSEILS

Les lentilles de contact doivent être ôtées avant l'utilisation du collyre : elles ne pourront être remplacées que 30 minutes après l'instillation.

Les flacons unidoses doivent être jetés après l'instillation.

LEXIQUE

cul-de-sac conjonctival

Espace formé lorsqu'on tire vers le bas la paupière inférieure, qui se décolle de l'œil et forme une cavité. C'est dans celle-ci que doivent être déposées les gouttes de collyre et les pommades ophtalmiques. Le médicament se répartit naturellement sur la totalité de l'œil. Il sera éliminé, comme les larmes, par le canal lacrymal, qui évacue les larmes vers le nez.