

VIDAL DE LA FAMILLE

VITAMINE A DULCIS

Fiche révisée le : 29/12/2022

Cicatrisant oculaire

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Interactions médicamenteuses.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#)
[Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p 100 g
Rétinol (vitamine A)	25 000 UI
Lanoline	+

INDICATIONS

Cette pommade ophtalmique cicatrisante contient de la [vitamine A](#).
Elle est utilisée dans le [traitement d'appoint](#) des troubles de la cicatrisation de la [cornée](#) et pour traiter la sécheresse oculaire.

ATTENTION

Toute plaie oculaire, même minime, peut avoir des conséquences graves. Elle doit faire l'objet d'un examen spécialisé, notamment en cas de rougeur, douleur et/ou vision floue.
Ce médicament contient de la lanoline qui peut provoquer des réactions cutanées (eczéma par exemple).
Conducteur : la vision est troublée par l'application de la pommade. Ce trouble disparaît en quelques minutes.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Cette pommade ophtalmique peut interagir avec les collyres : respectez un intervalle de 15 minutes entre deux instillations.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Tirer la paupière inférieure vers le bas tout en regardant vers le haut et déposer l'équivalent d'un grain de riz de pommade entre la paupière et le globe oculaire ([cul-de-sac conjonctival](#)).

Posologie usuelle:

2 ou 3 applications par jour.

CONSEILS

L'application correcte du produit peut nécessiter une aide.
Ce médicament ne doit pas être conservé plus de 28 jours après ouverture du tube.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Irritation passagère (picotement, brûlures).
Réaction allergique.

LEXIQUE

cornée

Partie centrale transparente de l'œil, qui recouvre la pupille et l'iris.

cul-de-sac conjonctival

Espace formé lorsqu'on tire vers le bas la paupière inférieure, qui se décolle de l'œil et forme une cavité. C'est dans celle-ci que doivent être déposées les gouttes de collyre et les pommades ophtalmiques. Le médicament se répartit naturellement sur la totalité de l'œil. Il sera éliminé, comme les larmes, par le canal lacrymal, qui évacue les larmes vers le nez.

traitement d'appoint

Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.

vitamine

Substance indispensable à la croissance et au bon fonctionnement de l'organisme. Les besoins en vitamines sont normalement couverts par une alimentation variée. Dans les pays développés, seule la carence en vitamine D, chez le jeune enfant ou le vieillard peu exposés au soleil, justifie une supplémentation systématique. Un apport supérieur aux besoins, par des médicaments notamment, peut être à l'origine d'un surdosage et de troubles divers (vitamines A et D essentiellement).