

VIDAL DE LA FAMILLE

LACRIFLUID

Fiche révisée le : 03/01/2023

Suppléance lacrymale

carbomère 980

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Interactions médicamenteuses.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#)
[Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p 10 g
Carbomère 980	13 mg

INDICATIONS

Ce collyre a un effet lubrifiant et mouillant à la surface de l'œil. Il compense une insuffisance de sécrétion naturelle de larmes. Il est utilisé dans le traitement de la sécheresse oculaire due à une insuffisance lacrymale (œil sec).

ATTENTION

Une irritation oculaire peut être due à une infection : en cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin.

Évitez de mettre l'embout de l'unidose en contact avec l'œil.

N'utilisez pas ce collyre de façon prolongée sans avis médical.

La vision peut être légèrement troublée par l'instillation du collyre. Dans ce cas, il est recommandé d'attendre que la vision redevienne normale avant de conduire ou de reprendre une activité à risque.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce collyre peut interagir avec d'autres collyres : respectez un intervalle de 15 minutes entre deux instillations.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce collyre peut être prescrit si besoin pendant la grossesse ou l'allaitement.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Tirer la paupière inférieure vers le bas tout en regardant vers le haut et déposer une goutte de collyre entre la paupière et le globe oculaire ([cul-de-sac conjonctival](#)).

Posologie usuelle:

- Adulte de plus de 18 ans : 1 goutte, 1 à 3 fois par jour.

CONSEILS

L'application correcte du produit peut nécessiter une aide, notamment chez une personne handicapée ou âgée.
Les unidoses ne contiennent pas de conservateur ; elles doivent être jetées juste après utilisation.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Trouble visuel, sensation de brûlure ou de picotements transitoires après l'instillation jusqu'à ce que le collyre se répartisse uniformément à la surface de l'œil.
Sensation de paupières collées, irritation.

LEXIQUE

cul-de-sac conjonctival

Espace formé lorsqu'on tire vers le bas la paupière inférieure, qui se décolle de l'œil et forme une cavité. C'est dans celle-ci que doivent être déposées les gouttes de collyre et les pommades ophtalmiques. Le médicament se répartit naturellement sur la totalité de l'œil. Il sera éliminé, comme les larmes, par le canal lacrymal, qui évacue les larmes vers le nez.