

VIDAL DE LA FAMILLE

PHYTOTUX

Fiche révisée le : 27/02/2007

Antitussif

Ipécacuanha, baume de Tolu

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#)
[Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p c à s
Ipécacuanha, extrait concentré pour sirop	787,5 mg
Baume de Tolu, extrait concentré pour sirop	858 mg
Saccharose	12 g
Alcool	270 mg

INDICATIONS

Ce sirop [antitussif](#) contient des extraits de plantes.

Il est utilisé dans le [traitement d'appoint](#) des affections bronchiques aiguës bénignes.

CONTRE-INDICATIONS

En raison de la teneur en alcool, ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 6 ans.

ATTENTION

La toux est un symptôme qui peut révéler de nombreuses maladies : consultez votre médecin si elle persiste plus de quelques jours. Ce médicament contient du [sucre](#) (saccharose) et de l'alcool en quantité notable.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

- Adulte : 1 cuillère à soupe, 1 à 4 fois par jour.

- Enfant de 30 à 50 kg (environ 10 à 15 ans) : 3 à 4 cuillères à café par jour.
- Enfant de 20 à 30 kg (environ 6 à 10 ans) : 2 ou 3 cuillères à café par jour.

CONSEILS

Des mesures simples permettent de calmer les toux sèches : boissons chaudes et humidification de l'air ambiant. Fumer, ou être exposé à la fumée des autres, nuit à l'efficacité du traitement.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

[Réaction allergique.](#)

LEXIQUE

antitussif

Médicament qui lutte contre la toux. Les antitussifs les plus puissants contiennent de la codéine ou de la codéthyline.

Réaction allergique

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

sucré

Terme général désignant différentes substances dont la plus répandue est le saccharose. D'autres sucres peuvent être contenus dans les médicaments : glucose, fructose, lactose, etc. Le glucose est le sucre utilisé par l'organisme ; il est le seul à circuler en quantité notable dans le sang.

Les édulcorants (faux sucre) sont autorisés chez les diabétiques ou les personnes suivant un régime, et sont très peu caloriques.

traitement d'appoint

Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.