

VIDAL DE LA FAMILLE

VERRUFILM

Fiche révisée le : 01/06/1996

Verrucide

acide salicylique, acide lactique

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#)
[Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p 100 g
Acide salicylique	16,7 g
Acide lactique	16,7 g
Collodion	+

INDICATIONS

Ce médicament contient des substances destinées à dissoudre la kératine, couche la plus externe de la peau. Le collodion contenu dans la solution forme, après séchage, une pellicule incolore et adhérente. Il est utilisé dans le traitement local des verrues.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'[allergie](#) aux [salicylés](#).

ATTENTION

La solution ne doit pas être appliquée sur les verrues du visage ou des organes génitaux.
La cicatrisation peut être très lente chez les diabétiques : consultez votre médecin.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Appliquer la solution avec la spatule, sans déborder sur la peau saine.
En complément de cette application, tous les 2 ou 3 jours, frotter doucement la zone traitée avec une lime en carton ou une pierre ponce en évitant de faire saigner. En cas de saignement, arrêter le traitement pendant 3 jours.

Posologie usuelle:

1 application quotidienne, de préférence le soir, pendant 8 semaines.

CONSEILS

Pour éviter toute irritation, ne mettez pas cette solution caustique en contact avec la peau saine qui entoure la zone à traiter.

Les verrues, dues à un [virus](#), sont contagieuses. L'apparition de verrues plantaires peut être prévenue par le port de chaussons souples dans les piscines publiques.

Ce produit étant inflammable, il doit être conservé à l'abri de la chaleur.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Sensation de brûlure nécessitant l'arrêt du traitement.

LEXIQUE***allergie***

Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.

salicylés

Famille de médicaments dont le plus connu est l'acide acétylsalicylique (aspirine).

virus

Organisme microscopique qui pénètre dans les cellules de l'hôte, où il se reproduit. Beaucoup plus petits que les bactéries, les virus sont insensibles aux antibiotiques. Ils peuvent parfois être détruits par des substances antivirales.