

# VIDAL DE LA FAMILLE

## DEBRICALM

Fiche révisée le : 22/05/2023

### Antispasmodique à visée digestive

trimébutine

**Ce médicament est un générique de DÉBRIDAT**

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#)  
[Lexique](#)

## COMPOSITION

	p cp
Trimébutine maléate	100 mg
Lactose	+

## INDICATIONS

Ce médicament régularise la motricité de l'intestin.

Il est utilisé dans le [traitement symptomatique](#) des spasmes douloureux d'origine digestive.

## ATTENTION

Ce médicament est disponible sans ordonnance ; il peut être utilisé sur les conseils de votre pharmacien. Néanmoins, il est préférable de demander l'avis d'un médecin en cas de mal de ventre qui n'a pas de cause connue, de douleurs qui se répètent fréquemment, ou de maux de ventre qui s'accompagnent de fièvre, de diarrhée ou d'un retard de règles.

## GROSSESSE et ALLAITEMENT

### Grossesse :

L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.

### Allaitement :

Les données disponibles ne permettent pas de savoir si ce médicament passe dans le lait maternel. Par prudence, il est déconseillé chez la femme qui allaite.

## MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

**Posologie usuelle:**

- Adulte : 1 ou 2 comprimés, 3 fois par jour.

La durée du traitement ne doit pas dépasser 7 jours sans avis médical.

## CONSEILS

Les mesures permettant de limiter le stress ont généralement un effet favorable sur les troubles liés à un dérèglement de l'intestin. La prise de ce médicament ne dispense pas des mesures diététiques que peut vous conseiller votre médecin ou votre pharmacien.

## EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Peu fréquents : éruption cutanée.

Fréquence indéterminée : [réaction allergique](#) (démangeaison, urticaire, œdème de Quincke...), réaction cutanée potentiellement grave.

---

## LEXIQUE

### ***réaction allergique***

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

### ***traitement symptomatique***

Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.