VIDAL DE LA FAMILLE

DACRYUM

Fiche révisée le : 10/07/2017

Solution de lavage oculaire

acide borique, borate de sodium

.Présentations. Composition.Indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Lexique

COMPOSITION (sommaire)

	p 100 ml
Acide borique	1,8 g
Borate de sodium	1,2 g

INDICATIONS (sommaire)

C'est une solution pour lavage ophtalmique antiseptique et légèrement astringente.
Elle est utilisée en cas d'irritation de l'œil.

ATTENTION (sommaire)

Une irritation oculaire peut être due à une infection : en cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin. N'utilisez pas ce médicament plus de 2 jours sans prendre un avis médical.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES (sommaire)

En cas de traitement avec un collyre, respecter un intervalle de 15 minutes entre deux instillations.

GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE (sommaire)

Retourner le récipient unidose puis presser légèrement dessus tout en dirigeant le jet vers l'œil. Essuyer l'excédent de solution avec une compresse.

Posologie usuelle:

1 à 3 lavages oculaires par jour.

CONSEILS (sommaire)

Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre pharmacien.
Cette solution ne doit pas être utilisée pour l'entretien des lentilles de contact.
L'application correcte du produit peut nécessiter une aide, notamment chez une personne handicapée ou âgée.
Un récipient unidose permet une instillation dans les deux yeux et doit être jeté après utilisation.

LEXIQUE (sommaire)

antiseptique
Substance qui détruit localement les bactéries, réduisant leur nombre et empêchant leur prolifération. Certains antiseptiques sont également actifs sur les champignons microscopiques et les virus.

lentilles de contact
Dispositif optique souple ou rigide placé sur la cornée, destiné à corriger un défaut de la vision.
Les lentilles utilisées actuellement sont toutes en matière plastique. Il en existe deux types :

- Les lentilles rigides, plus ou moins perméables à l'oxygène. Leur faible diamètre (elles ne couvrent pas la totalité de la cornée) facilite l'oxygénation de la cornée : l'oxygène contenu dans les larmes peut diffuser sous et autour de la lentille.
- Les lentilles souples, plus ou moins hydrophiles. Elles sont plus faciles à supporter au début, mais leur grand diamètre et leur perméabilité à l'oxygène limitée ne facilitent pas l'oxygénation de la cornée. Elles peuvent poser des problèmes de tolérance à long terme.