

VIDAL DE LA FAMILLE

LAMIDERM

Fiche révisée le : 27/09/2010

Protecteur cutané

trolamine

Ce médicament est un générique de BIAFINE

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p 100 g
Trolamine	0,67 g
Paraffine	+

INDICATIONS

C'est une émulsion protectrice et calmante.

Elle est utilisée dans le traitement des brûlures, des plaies superficielles non infectées et des rougeurs après [radiothérapie](#).

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé sur des plaies qui saignent ou sur des lésions infectées.

ATTENTION

Le soulagement apporté par l'application de cette émulsion après un coup de soleil ne doit pas conduire à des expositions solaires intempestives.

Évitez d'utiliser cette émulsion de manière prolongée et sur des surfaces étendues sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament contient des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas sans l'avis préalable de votre pharmacien ou de votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Brûlures du 1er degré : appliquer une couche épaisse sur la zone à traiter, 2 à 4 fois par jour.

Brûlures du 2e degré et autres plaies : appliquer une couche épaisse ; attendre que l'émulsion soit absorbée par la peau et renouveler les applications tant qu'il ne reste pas un excédent d'émulsion. La dernière application peut être recouverte d'une compresse humide.

Rougeurs après radiothérapie : 2 ou 3 applications par jour.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Picotements passagers.

Rarement : [réaction allergique](#) cutanée.

LEXIQUE

radiothérapie

Utilisation de la radioactivité pour soigner certaines maladies, notamment des cancers.

réaction allergique

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.