VIDAL DE LA FAMILLE

MONAZOL crème

Fiche révisée le : 11/12/2020

Antifongique local

sertaconazole

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

COMPOSITION (sommaire)

	p 100 g
Sertaconazole nitrate	2 g
Parahydroxybenzoate de méthyle	+

INDICATIONS (sommaire)

Ce médicament d'action locale contient un antifongique de la famille des imidazolés.
Il est utilisé dans le traitement de certaines maladies de la peau et des muqueuses dues à des champignons microscopiques (mycoses) : candidose et dermatophyties.

CONTRE-INDICATIONS (sommaire)

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie aux antifongiques de la famille des imidazolés.

ATTENTION (sommaire)

Évitez d'utiliser ce médicament, notamment chez l'enfant, de manière prolongée et sur des surfaces étendues ou profondément lésées sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
Rincez abondamment en cas de contact accidentel avec les yeux.

GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)

Le passage du médicament dans le sang est négligeable. Il peut être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement si le médecin le juge nécessaire.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE (sommaire)

La crème doit être appliquée après lavage et séchage soigneux de la zone à traiter.

Posologie usuelle:

1 application par jour.

CONSEILS (sommaire)

En cas de candidose, évitez d'utiliser des savons acides : ils favorisent la multiplication des champignons.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES (sommaire)

Irritation cutanée (démangeaisons, rougeur).
Réaction allergique (présence de parahydroxybenzoate de méthyle).

LEXIQUE (sommaire)

allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.

antifongique

Médicament qui détruit les champignons et levures microscopiques. Ceux-ci peuvent être présents sur la peau ou les muqueuses (tube digestif ou organes génitaux). La levure la plus courante est le Candida albicans.

candidose
Multiplication anormale d'une levure microscopique, Candida albicans le plus souvent. Il s'agit d'une complication fréquente et bénigne des traitements antibiotiques. Les principaux symptômes sont des troubles digestifs, une coloration marron ou noire de la langue, des taches blanches sur le palais ou la langue (muguet), des démangeaisons ou des brûlures de la vulve ou du gland.

dermatophyties
Infection de la peau ou des ongles par un champignon microscopique (dermatophyte).

imidazolés
Famille de médicaments qui regroupe des antifongiques, des antibiotiques et des antiparasitaires.

muqueuses
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).

mycoses
Affection due à des champignons microscopiques, favorisée par la prise d'antibiotiques.

Réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.