## VIDAL DE LA FAMILLE

# PHLOROGLUCINOL BIOGARAN

Fiche révisée le : 04/05/2022

### **Antispasmodique**

### Ce médicament est un générique de SPASFON-LYOC

.<u>Composition</u>.<u>Indications</u>.<u>Contre-indications</u>.<u>Grossesse et allaitement</u>.<u>Mode d'emploi et posologie</u>. <u>Conseils</u>.<u>Effets</u> indésirables.Lexique

### COMPOSITION

	р ср
Phloroglucinol hydraté	160 mg
Aspartam	+

### **INDICATIONS**

Ce médicament est un <u>antispasmodique</u>. Il lutte contre les contractions anormales et douloureuses de l'intestin, des <u>voies biliaires</u>, des voies urinaires et de l'utérus.

Il est utilisé dans le traitement des spasmes douloureux d'origines digestive (<u>colites</u> spasmodiques), biliaire (coliques hépatiques), urologique (coliques néphrétiques) et gynécologique (règles douloureuses et contractions de l'utérus pendant la grossesse).

## CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de phénylcétonurie (présence d'aspartam).

## **GROSSESSE et ALLAITEMENT**

### Grossesse:

Les données scientifiques actuellement disponibles n'ont pas mis en évidence de problème particulier lors de l'utilisation de ce médicament pendant la grossesse à la dose préconisée. Néanmoins, ne l'utilisez pas sans avis médical.

### Allaitement:

Les données actuellement disponibles ne permettent pas de savoir si ce médicament passe dans le lait maternel : il est déconseillé pendant l'allaitement sans avis médical.

## MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Les comprimés <u>orodispersibles</u> peuvent être dissous dans un verre d'eau ou placés sous la langue pour avoir un effet plus rapide. Respecter un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise.

### Posologie usuelle:

 Adulte : 1 comprimé à prendre au moment de la crise et à renouveler éventuellement en cas de spasmes importants, sans dépasser 3 comprimés par jour.

## **CONSEILS**

En cas de <u>coliques néphrétiques</u>, il est généralement conseillé de boire abondamment entre les crises pour lutter contre la formation de calculs. Cependant, lors d'une crise, l'absorption de liquide doit être limitée afin de ne pas accroître la douleur. En cas de contractions douloureuses de l'utérus au cours de la grossesse, le repos fait partie intégrante du traitement.

# **EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES**

Rarement : urticaire, démangeaisons.

Exceptionnellement : œdème de Quincke, choc anaphylactique.

### **LEXIQUE**

## antispasmodique

Médicament qui lutte contre les spasmes. Les antispasmodiques agissent généralement en empêchant la contraction de fibres musculaires présentes dans la paroi de l'intestin ou des voies urinaires.

### choc anaphylactique

Choc d'origine allergique se manifestant par une baisse brutale de la tension artérielle, due à une dilatation extrême des vaisseaux sanguins. Il survient après un contact avec une substance allergisante (aliment, piqûre d'insecte, injection ou absorption de médicament).

### coliques néphrétiques

Douleur aiguë du ventre ou du dos provoquée par un calcul qui obstrue les voies urinaires. Il s'agit généralement de calculs d'acide urique ou de sels de calcium.

### colites

Inflammation d'une partie ou de la totalité du côlon. Elle peut être causée par une infection bactérienne ou parasitaire, une maladie inflammatoire (maladie de Crohn) ou un dérèglement de l'intestin (colite spasmodique).

### orodispersible

Qualifie un comprimé qui se désagrège dans la bouche au contact de la salive. Il peut également être dispersé dans un verre d'eau avant ingestion.

### phénylcétonurie

Maladie héréditaire qui se caractérise par l'absence d'une enzyme et qui conduit à l'accumulation dans le sang d'un produit toxique. Son dépistage est systématique à la naissance. Le traitement repose sur un régime alimentaire spécifique pendant la petite enfance.

### Quincke

œdème deRéaction allergique touchant généralement le visage. L'œdème de Quincke se traduit par un gonflement parfois spectaculaire. Les paupières sont souvent les premières touchées. Dans les rares cas où l'œdème touche la gorge, des troubles respiratoires peuvent survenir et un traitement urgent est nécessaire.

### voies

• Chemin (voie d'administration) utilisé pour administrer les médicaments : voie orale, sublinguale, sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, intradermique, transdermique.

• Ensemble d'organes creux permettant le passage de l'air (voies respiratoires), des aliments (voies digestives), des urines (voies urinaires), de la bile (voies biliaires), etc.

## voies biliaires

Voies excrétrices conduisant la bile du foie au duodénum. Elles comprennent le canal cholédoque et la vésicule biliaire, réservoir qui stocke la bile en excès entre les repas.