VIDAL DE LA FAMILLE

LAMISILATE

Fiche révisée le : 16/10/2020

Antifongique local

terbinafine

.Présentations. Composition.Indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

COMPOSITION (sommaire)

	p 100 g
Terbinafine chlorhydrate	1 g
Alcool	+

INDICATIONS (sommaire)

Ce médicament d'usage local contient un antifongique.
Il est utilisé dans le traitement des mycoses du pied («pied d'athlète») dues à des champignons microscopiques.

ATTENTION (sommaire)

Ce médicament peut être utilisé sur le conseil de votre pharmacien si vous ressentez des démangeaisons ou des brûlures entre les orteils, associées ou non à des fissures. En l'absence d'amélioration une semaine après la fin du traitement, contactez votre médecin ; un prélèvement peut être nécessaire pour déterminer la cause des lésions.
La crème ne doit pas être appliquée sur des lésions étendues sans avis médical.
Rincez abondamment en cas de contact accidentel avec les yeux.

GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)

Grossesse :
L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.

Allaitement :
Après application cutanée, ce médicament ne passe que faiblement dans le sang ; néanmoins, ne l'utilisez pas pendant l'allaitement sans avis médical

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE (sommaire)

La crème doit être appliquée après un lavage et un séchage soigneux de la zone à traiter.

Posologie usuelle:

- Adulte et enfant de plus de 12 ans : 1 application par jour, pendant 7 jours.

CONSEILS (sommaire)

Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre pharmacien.
En cas de pied d'athlète, il est recommandé d'utiliser un savon acide : votre pharmacien pourra vous aider pour son choix.
La fréquentation répétée de lieux publics chauds et humides (sauna, etc.) doit être évitée.
Une transpiration excessive contribue au développement des mycoses. Le port de chaussettes en fibre naturelle (coton, laine) est recommandé. Une même paire de chaussures ne devrait pas être portée deux jours de suite.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES (sommaire)

Irritation cutanée.
Rarement : réaction allergique cutanée nécessitant l'arrêt des applications.

LEXIQUE (sommaire)

antifongique
Médicament qui détruit les champignons et levures microscopiques. Ceux-ci peuvent être présents sur la peau ou les muqueuses (tube digestif ou organes génitaux). La levure la plus courante est le Candida albicans.

mycoses
Affection due à des champignons microscopiques, favorisée par la prise d'antibiotiques.

réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.