

VIDAL DE LA FAMILLE

LIPOFÉINE

Traitement local de l'obésité

caféine

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#)
[Lexique](#)

COMPOSITION

	p 100 g
Caféine	5 g
Alcool à 96°	+

INDICATIONS

Ce gel contient de la caféine qui, en pénétrant à travers la peau, active la transformation des graisses locales. Il est utilisé dans le traitement des surcharges graisseuses localisées (culotte de cheval).

ATTENTION

En raison de la présence d'[alcool](#), ce gel ne doit pas être appliqué sur une peau lésée ou irritée.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament ne contient que des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

1 application de 10 à 20 g de gel par jour, pendant 5 à 6 semaines.

CONSEILS

L'utilisation de ce médicament doit s'accompagner d'une alimentation équilibrée et d'exercices musculaires.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Éruption cutanée nécessitant l'arrêt du traitement.
Sécheresse de la peau.

LEXIQUE

alcool

Nom général désignant une famille de substances qui ont la propriété de pouvoir être mélangées à l'eau et aux corps gras. L'alcool le plus courant est l'alcool éthylique (éthanol), mais il existe de nombreux autres alcools : méthanol, butanol, etc. Le degré d'une solution alcoolique correspond au volume d'alcool pur présent dans 100 ml de solution, en sachant que 1 verre ballon de vin ou 1 demi de bière (25 cl) contiennent environ 8 g d'alcool.

Lorsque l'alcool est utilisé comme antiseptique, un dénaturant d'odeur désagréable lui est souvent ajouté pour éviter qu'il soit bu. Contrairement à une croyance répandue, l'alcool à 70° (ou même à 60°) est un meilleur antiseptique que l'alcool à 90°.