

VIDAL DE LA FAMILLE

NORMACOL LAVEMENT

Fiche révisée le : 09/04/2013

Laxatif par voie rectale

dihydrogénophosphate et hydrogénophosphate de sodium

[.Présentations.](#) [Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION [\(sommaire\)](#)

	p unidose Ad	p unidose Enf
Dihydrogénophosphate de sodium	23,66 g	10,92 g
Hydrogénophosphate de sodium	10,4 g	4,8 g
Parahydroxybenzoate de méthyle	+	+
Acide sorbique	+	+

INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

C'est un laxatif administré par [voie](#) rectale. Il ramollit les selles et déclenche une contraction du rectum qui permet leur évacuation. Il est utilisé pour préparer le rectum avant certains examens endoscopiques ou radiologiques. Il est également utilisé dans le traitement de la constipation, notamment lorsque les selles s'accumulent dans le rectum et que les poussées répétées ne permettent pas de les évacuer.

CONTRE-INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Ce traitement ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- maladie responsable d'une obstruction de l'intestin,
- [mégacôlon](#),
- [insuffisance rénale](#) grave,
- enfant de moins de 15 ans (solution rectale Adulte),
- enfant de moins de 3 ans (solution rectale Enfant).

ATTENTION [\(sommaire\)](#)

Il est nécessaire de boire beaucoup d'eau, particulièrement chez la personne âgée
Ce médicament ne doit pas être utilisé de façon prolongée ou répétée sans avis médical.
Des précautions sont nécessaires chez la personne fragilisée ou atteinte d'[insuffisance cardiaque](#), d'[hémorroïdes](#), de [fissure anale](#) ou de [rectocolite hémorragique](#).

GROSSESSE et ALLAITEMENT [\(sommaire\)](#)

Les laxatifs par voie rectale peuvent être utilisés de façon ponctuelle pour traiter la constipation de la femme enceinte ou qui allaite.
Néanmoins, n'utilisez pas ce lavement pendant la grossesse ou l'allaitement sans avis médical.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE [\(sommaire\)](#)

Introduire la canule dans le rectum et vider doucement le flacon par pression.
Le contenu du flacon ne doit en aucun cas être avalé.
L'effet laxatif se manifeste dans les 5 minutes qui suivent l'administration du lavement.

Posologie usuelle:

1 lavement 5 à 20 minutes avant le moment choisi pour la selle en cas de constipation ou 1 lavement la veille au soir et 1 lavement le jour de l'examen en cas de préparation à un examen du rectum.

CONSEILS [\(sommaire\)](#)

Le traitement de la constipation repose essentiellement sur des mesures hygiéno-diététiques : alimentation riche en fibres, eau de boisson riche en magnésium, activité physique régulière et amélioration de la position sur les toilettes.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES [\(sommaire\)](#)

[Réaction allergique.](#)

Perte de sels minéraux, en cas de surdosage.
Irritation locale et exceptionnellement des nécroses du rectum.

LEXIQUE [\(sommaire\)](#)

fissure anale

Petite crevasse du pourtour de l'anus, souvent peu ou pas visible, provoquant des douleurs vives pendant et après la selle.

hémorroïdes

Dilatation anormale d'une veine de l'anus ou du rectum se développant soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Elle peut être à l'origine d'un saignement.

insuffisance cardiaque

Incapacité du cœur à remplir sa fonction de pompe. Les principaux symptômes de l'insuffisance cardiaque sont une fatigue et un essoufflement lors d'un effort.

insuffisance rénale

Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.

mégacôlon

Dilatation d'une partie du gros intestin où s'accumulent gaz et matières fécales. Il s'accompagne fréquemment de constipation.

Réaction allergique

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

rectocolite hémorragique

Maladie inflammatoire du rectum et du côlon, qui évolue par poussées. Chaque poussée s'accompagne de fièvre, de selles glaireuses et sanglantes.

voie

- Chemin (voie d'administration) utilisé pour administrer les médicaments : voie orale, sublinguale, sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, intradermique, transdermique.
- Ensemble d'organes creux permettant le passage de l'air (voies respiratoires), des aliments (voies digestives), des urines (voies urinaires), de la bile (voies biliaires), etc.