

# VIDAL DE LA FAMILLE

## OPHTACALMFREE

Fiche révisée le : 24/10/2014

### Collyre antiallergique

cromoglycate de sodium

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Interactions médicamenteuses.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#)  
[Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

### COMPOSITION

	p 100 ml
Cromoglycate de sodium	2 g

### INDICATIONS

C'est un collyre antiallergique.  
Il est utilisé dans le [traitement symptomatique](#) des [allergies](#) oculaires.

### ATTENTION

Ce médicament peut être utilisé sur les conseils de votre pharmacien pour soulager les symptômes de l'[allergie](#) oculaire (picotement, larmolement, yeux rouges, gonflement des paupières). Seules les [conjonctivites](#) allergiques déjà diagnostiquées sont susceptibles d'être traitées en automédication. En cas de persistance des symptômes, consultez votre médecin.

Compte tenu de son absence de toxicité, ce médicament peut être obtenu sans ordonnance, néanmoins un avis médical est nécessaire avant de l'utiliser chez l'enfant.

Conducteur : l'instillation de ce collyre peut provoquer une gêne visuelle transitoire.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce collyre peut interagir avec d'autres collyres : respectez un intervalle de 15 minutes entre deux instillations.

### GROSSESSE et ALLAITEMENT

#### Grossesse :

L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.

#### Allaitement :

Ce collyre peut être utilisé pendant l'allaitement.

## MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Tirer la paupière inférieure vers le bas tout en regardant vers le haut et déposer une goutte de collyre entre la paupière et le globe oculaire ([cul-de-sac conjonctival](#)).

### Posologie usuelle:

- Adulte et enfant de plus de 15 ans : 1 goutte, 2 à 6 fois par jour.

Le traitement ne doit pas dépasser 7 jours sans avis médical.

## CONSEILS

Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre pharmacien.

Veiller à ne pas mettre en contact l'embout du flacon avec les doigts pour éviter de contaminer le collyre avec les germes présents sur la peau.

L'application correcte du produit peut nécessiter une aide.

Le flacon ne doit pas être conservé plus de 3 mois après une première utilisation.

## EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Gêne visuelle passagère après instillation.

[Réaction allergique](#).

---

## LEXIQUE

### ***allergies***

Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.

### ***conjonctivites***

Inflammation de la conjonctive, due à un corps étranger, à une allergie, à une infection ou à un produit irritant.

### ***cul-de-sac conjonctival***

Espace formé lorsqu'on tire vers le bas la paupière inférieure, qui se décolle de l'œil et forme une cavité. C'est dans celle-ci que doivent être déposées les gouttes de collyre et les pommades ophtalmiques. Le médicament se répartit naturellement sur la totalité de l'œil. Il sera éliminé, comme les larmes, par le canal lacrymal, qui évacue les larmes vers le nez.

### ***Réaction allergique***

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

### ***traitement symptomatique***

Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.