

# VIDAL DE LA FAMILLE

## ONYTEC

Fiche révisée le : 30/01/2023

### Antifongique local

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#)  
[Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

### COMPOSITION

	p g
Ciclopirox	80 mg
Alcool céstostéarylique	+
Éthanol	+

### INDICATIONS

Ce médicament est un [antifongique](#) local, actif sur un grand nombre de champignons, notamment sur les [dermatophytes](#). Il se présente sous forme de vernis à ongles permettant la diffusion de la substance active à travers l'ongle. Il est utilisé dans le traitement de certaines infections des ongles dues à des champignons microscopiques ([mycoses](#)).

### CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients de moins de 18 ans (en l'absence d'études).

### ATTENTION

En cas de mycose importante de l'ongle (plus de la moitié de la surface de l'ongle) ou étendue à plus de 3 ongles, un traitement [antifongique](#) par voie orale est généralement envisagé. De même, le traitement oral complémentaire peut être nécessaire pour traiter les patients diabétiques ou immunodéprimés qui ont un risque accru de complications bactériennes.

Bien que ce médicament puisse être acheté sans ordonnance, un avis médical est nécessaire cas de [diabète](#), de déficit immunitaire, de troubles circulatoires dans les mains ou les pieds, d'ongle douloureux ou endommagé, de [psoriasis](#) ou d'autre maladie cutanée chronique.

Rincez abondamment en cas de contact accidentel avec les yeux.

### GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.

## MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Ce vernis se rince à l'eau. Il n'est donc pas nécessaire pour l'enlever d'utiliser un dissolvant ou une lime à ongles. Les ongles infectés doivent être lavés puis séchés soigneusement avant chaque application. Le vernis doit être appliqué sur la totalité de l'ongle, sur la peau autour de l'ongle, et si possible, sous l'ongle. Il sèche en 30 secondes. Il est recommandé de mettre le vernis le soir avant le coucher, les ongles traités ne devant pas être lavés pendant les 6 heures suivant l'application. En cas d'élimination intempestive du vernis, celui-ci peut être appliqué à nouveau.

### Posologie usuelle:

- Adulte : 1 application par jour.

La durée du traitement dépend des cas, plusieurs mois en général. Le traitement peut être arrêté lorsque l'ongle infecté a été totalement éliminé par la repousse de l'ongle sain.

## CONSEILS

Il ne faut pas appliquer de vernis ordinaire ou de produit cosmétique sur les ongles traités. En cas de lésion importante des ongles des orteils, un meulage préalable par un pédicure facilite l'action du médicament. Une transpiration excessive contribue au développement des lésions dues à des champignons. Le port de chaussettes en fibre naturelle (coton, laine) est recommandé. La même paire de chaussures ne doit pas être portée deux jours de suite. Sous l'effet du froid (température inférieure à 15° C), le vernis peut se gélifier. Dans ce cas, il est recommandé de réchauffer le flacon entre les mains jusqu'à ce que le vernis redevienne limpide. Ce médicament ne doit pas être conservé plus de 6 mois après ouverture du flacon.

## EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Très rares : rougeur, squames, brûlure ou démangeaisons au site d'application. Fréquence indéterminée : éruption cutanée, eczéma de contact, décolorations passagère de l'ongle (qui peut aussi être due à la mycose elle-même).

---

## LEXIQUE

### *antifongique*

Médicament qui détruit les champignons et levures microscopiques. Ceux-ci peuvent être présents sur la peau ou les muqueuses (tube digestif ou organes génitaux). La levure la plus courante est le *Candida albicans*.

### *dermatophytes*

Champignon microscopique responsable d'infections cutanées : teigne, pied d'athlète, onyxis (lésion des ongles), etc.

### *diabète*

Terme général désignant les maladies se traduisant par l'émission d'urines abondantes et par une soif intense. Employé seul, le mot diabète concerne généralement le diabète sucré, qui correspond à une perturbation de la régulation des sucres de l'organisme par l'insuline. Il se traduit par l'augmentation du sucre (glucose) dans le sang et par sa présence éventuelle dans les urines. Il existe deux sortes de diabète sucré : le diabète de type 1, ou insulino-dépendant, qui nécessite un traitement par l'insuline en injection, et le diabète de type 2, ou non insulino-dépendant, qui peut, dans un premier temps, être traité par les antidiabétiques oraux.

### *mycoses*

Affection due à des champignons microscopiques, favorisée par la prise d'antibiotiques.

### *psoriasis*

Maladie de la peau touchant surtout les coudes et les genoux, mais aussi les ongles et le cuir chevelu. Le psoriasis se manifeste par des plaques épaisses, rouges, et recouvertes d'une pellicule blanche adhérente. Le psoriasis peut être plus ou moins inflammatoire. Il

se présente parfois sous forme de petits boutons disséminés (psoriasis en gouttes). Le psoriasis peut avoir l'aspect de pustules.