VIDAL DE LA FAMILLE

ERAZABAN

Fiche révisée le : 02/02/2018

Antiherpétique local

docosanol

.Composition.Indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables. Lexique

COMPOSITION

	p 1 g
Docosanol	100 mg
Propylèneglycol	+

INDICATIONS

Ce médicament est un antiviral dont le mécanisme d'action est mal connu. Il bloque la multiplication de certains virus, notamment sur celui de l'herpès.
Il est utilisé dans le traitement de l'herpès labial (également appelé «bouton de fièvre»), dès l'apparition des premiers symptômes (douleur, picotements, rougeur...). Son efficacité n'a pas été démontrée si l'application est débutée au stade des vésicules.

ATTENTION

N'utilisez pas cette crème pour des lésions d'herpès situées ailleurs que sur les lèvres.
Ce médicament traite les poussées d'herpès mais n'élimine pas le virus de l'organisme. Il n'empêche donc pas la survenue d'autres crises.
Les ultraviolets favorisent les poussées d'herpès labial. Évitez l'exposition au soleil fort ou aux UV, ou appliquez un écran total en quantité suffisante et renouvelée.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Cette crème peut être utilisée pendant la grossesse ou l'allaitement.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Le traitement doit être commencé dès les premiers symptômes annonçant une poussée d'herpès labial.

Posologie usuelle:

- Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 applications par jour.

La durée du traitement varie de 4 à 10 jours.

CONSEILS

Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre pharmacien.
L'herpès est une maladie contagieuse. Lavez-vous soigneusement les mains après l'application de la crème ou en cas de contact avec les lésions ; notamment, évitez absolument de toucher vos yeux avec des doigts contaminés. Le risque de contagion est maximal au moment où apparaissent les vésicules (petites cloques sous la peau).
Le tube ne doit pas être conservé plus de 6 mois après ouverture ; pensez à noter la date de première utilisation sur la boîte.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Rougeur, sécheresse de la peau.
Irritation (présence de propylèneglycol).

LEXIQUE

antiviral
Médicament capable de lutter contre les virus.

herpès

- Maladie virale due essentiellement aux virus Herpes simplex 1 et 2. Elle se manifeste, lors des poussées, par une éruption douloureuse de fines vésicules. Entre les poussées, le virus reste présent dans les ganglions nerveux. Le virus de type 1 donne plutôt des lésions situées autour de la bouche, alors que le virus de type 2 atteint de préférence les organes génitaux.
- Famille de virus (Herpèsvirus) qui comprend notamment l'Herpes simplex virus (HSV 1 et 2), le virus varicelle-zona (VZV), le Cytomégalovirus (CMV) et le virus d'Epstein-Barr (EBV) de la mononucléose infectieuse.

symptômes
Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.

virus
Organisme microscopique qui pénètre dans les cellules de l'hôte, où il se reproduit. Beaucoup plus petits que les bactéries, les virus sont insensibles aux antibiotiques. Ils peuvent parfois être détruits par des substances antivirales.