

VIDAL DE LA FAMILLE

MYLEUGYNE crème

Fiche révisée le : 13/10/2022

Antifongique local

éconazole

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#)
[Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

| | p 100 g |
|---------------------|---------|
| Éconazole nitrate | 1 g |
| Acide benzoïque | + |
| Butylhydroxyanisole | + |
| Butylhydroxytoluène | + |

INDICATIONS

Ce médicament d'action locale contient un [antifongique](#) de la famille des [imidazolés](#).

Il est utilisé dans le traitement de certaines maladies de la peau dues à des champignons microscopiques ([mycoses](#)) : [candidose](#), [dermatophyties](#)...

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'[allergie](#) aux [antifongiques](#) de la famille des [imidazolés](#).

ATTENTION

Évitez d'utiliser ce médicament, notamment chez l'enfant, de manière prolongée et sur des surfaces étendues ou profondément lésées sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

Rincez abondamment en cas de contact accidentel avec les yeux.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

L'application doit se faire après lavage et séchage soigneux de la zone à traiter.

Appliquer la crème directement sur les lésions et masser pour faire pénétrer. Dans les plis de la peau, la crème doit être appliquée en petite quantité pour limiter le risque de macération.

Posologie usuelle:

1 application, 2 fois par jour.

La durée du traitement varie entre 1 à 3 semaines selon les cas. Elle peut être plus longue dans certaines localisations.

CONSEILS

En cas de [candidose](#), évitez d'utiliser des savons acides : ils favorisent la multiplication des champignons.

Une transpiration excessive contribue au développement des lésions dues à des champignons. Le port de chaussettes en fibre naturelle (coton, laine) est recommandé. La même paire de chaussures ne doit pas être portée deux jours de suite.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Rarement : sensation de brûlures, démangeaisons, rougeur de la peau.

Très rarement : [eczéma](#) de contact.

LEXIQUE

allergie

Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.

antifongique

Médicament qui détruit les champignons et levures microscopiques. Ceux-ci peuvent être présents sur la peau ou les muqueuses (tube digestif ou organes génitaux). La levure la plus courante est le *Candida albicans*.

candidose

Multiplication anormale d'une levure microscopique, *Candida albicans* le plus souvent. Il s'agit d'une complication fréquente et bénigne des traitements antibiotiques. Les principaux symptômes sont des troubles digestifs, une coloration marron ou noire de la langue, des taches blanches sur le palais ou la langue (muguet), des démangeaisons ou des brûlures de la vulve ou du gland.

dermatophyties

Infection de la peau ou des ongles par un champignon microscopique (dermatophyte).

eczéma

Maladie de la peau se manifestant par des boutons et de vives démangeaisons. L'eczéma peut être dû au contact avec une substance allergisante (eczéma de contact) ou être lié à une prédisposition génétique (eczéma atopique).

imidazolés

Famille de médicaments qui regroupe des antifongiques, des antibiotiques et des antiparasitaires.

mycoses

Affection due à des champignons microscopiques, favorisée par la prise d'antibiotiques.