

VIDAL DE LA FAMILLE

ELUDRILPERIO

Fiche révisée le : 11/07/2023

Bain de bouche antiseptique

chlorhexidine

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Interactions médicamenteuses.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p 100 ml
Chlorhexidine digluconate	0,2 mg
Alcool benzylique	+
Hydroxystéarate de macroglycérol	+
Propylèneglycol	+
Rouge cochenille A	+

INDICATIONS

Cette solution pour [bain de bouche](#) contient un [antiseptique](#).

Elle est utilisée dans le [traitement d'appoint](#) des affections des gencives liées à la plaque dentaire (gingivite, parodontite) et lors des soins avant ou après une opération des dents ou des gencives.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 6 ans.

ATTENTION

L'usage prolongé des traitements antiseptiques locaux ([gargarisme](#), [collutoire](#), pastille) n'est pas souhaitable ; il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la gorge.

En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours, en cas d'apparition de fièvre, consultez votre médecin.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Il est généralement inutile d'associer des [antiseptiques](#) différents. Ceux-ci peuvent être contenus dans de nombreux produits disponibles en automédication : pastille, [collutoire](#) et solution nasale ; demandez conseil à votre pharmacien.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

La solution doit être utilisée pure et non diluée.

Faire un [bain de bouche](#) avec un gobelet doseur (10 ml) de solution, après un brossage et un rinçage soigneux des dents. Conserver la solution en bouche 1 minute avant de la recracher. La solution ne doit pas être avalée.

Posologie usuelle:

- Adulte et enfant de plus de 6 ans : 1 bain de bouche, 2 fois par jour.

La durée habituelle du traitement est de 7 jours.

CONSEILS

Il est conseillé de ne pas se rincer la bouche, ni de s'alimenter, ni de boire immédiatement après un [bain de bouche](#), afin de permettre aux substances actives d'agir.

Certains dentistes et stomatologistes recommandent de ne pas pratiquer de bain de bouche dans les heures qui suivent une extraction dentaire, afin d'éviter de faire saigner la plaie.

Après ouverture, le flacon ne doit pas être conservé plus de 26 jours.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Coloration brune des dents ou de la langue, gonflement des parotides (glandes salivaires situées en arrière des mâchoires). Ces effets sont réversibles à l'arrêt du traitement.

Sensation de brûlure de la langue, trouble du goût. Généralement, ces effets apparaissent en début de traitement et s'estompent avec la poursuite du traitement.

[Réaction allergique](#) nécessitant l'arrêt du traitement.

LEXIQUE

antiseptique

Substance qui détruit localement les bactéries, réduisant leur nombre et empêchant leur prolifération. Certains antiseptiques sont également actifs sur les champignons microscopiques et les virus.

bain de bouche

Mode de traitement local qui consiste à laisser au contact de lésions de la bouche ou des gencives un médicament pur ou dilué dans de l'eau froide ou tiède.

collutoire

Médicament qui agit par contact sur l'arrière-gorge et les parois internes de la bouche. Il est administré par pulvérisation ou en badigeon.

gargarisme

Mode de traitement local qui vise à laisser au contact de l'arrière-gorge un médicament pur ou dilué dans de l'eau froide ou tiède. Il se pratique la tête penchée en arrière, une expiration continue empêchant le liquide de descendre dans les poumons. La solution utilisée ne doit pas être avalée.

Réaction allergique

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

traitement d'appoint

Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.