VIDAL DE LA FAMILLE

ARNICA MONTANA TEINTURE MÈRE WELEDA

Fiche révisée le : 04/07/2014

Homéopathie

.<u>Composition</u>.<u>Indications</u>.<u>Contre-indications</u>.<u>Attention</u>.<u>Grossesse et allaitement</u>.<u>Mode d'emploi et posologie</u>. <u>Conseils</u>. <u>Effets indésirables</u>.<u>Lexique</u>

COMPOSITION

Arnica montana, teinture mère ; alcool.

INDICATIONS

Ce médicament homéopathique contient de l'arnica, destiné à lutter contre les <u>œdèmes</u> et les <u>inflammations</u>. Il est traditionnellement utilisé dans le traitement local des bleus et des bosses survenant après un choc.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- allergie aux plantes de la famille des Astéracées.
- nourrisson de moins de 1 an.

ATTENTION

L'utilisation de cette solution chez l'enfant nécessite un avis médical. N'appliquez pas la solution sur une plaie, les lésions infectées, ni sur les muqueuses.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

La solution est utilisée pure chez l'adulte ou diluée au dixième pour les enfants et les personnes présentant un terrain allergique.

Posologie usuelle:

- Adulte: 50 gouttes (2,5 ml) de solution sur une compresse, à chaque application.
- Enfant et personne présentant un terrain allergique : 5 gouttes de solution diluée dans 2,5 ml d'eau sur une compresse.

La durée du traitement ne doit pas dépasser une semaine sans avis médical.

CONSEILS

Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Réaction allergique.

Irritation ou sécheresse cutanée en cas d'applications répétées (présence d'alcool).

LEXIQUE

allergie

Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.

inflammations

Réaction naturelle de l'organisme contre un élément reconnu comme étranger. Elle se manifeste localement par une rougeur, une chaleur, une douleur ou un gonflement.

œdèmes

Accumulation d'eau ou de lymphe provoquant un gonflement localisé.

Réaction allergique

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.