

VIDAL DE LA FAMILLE

CALENDULA OFFICINALIS TEINTURE MÈRE WELEDA

Fiche révisée le : 04/07/2014

Protecteur cutané

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#)
[Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

Calendula officinalis, teinture mère ; alcool.

INDICATIONS

Ce médicament homéopathique contient un extrait de plante à visée adoucissante et protectrice.
Il est traditionnellement utilisé dans le traitement local des plaies superficielles, des crevasses, écorchures, gerçures et des piqûres d'insectes.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'[allergie](#) aux plantes de la famille des Composées.

ATTENTION

L'utilisation de cette solution chez l'enfant de moins de 6 ans nécessite un avis médical.
N'appliquez pas la solution sur les lésions infectées, ni sur les muqueuses.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

La solution est utilisée pure chez l'adulte ou diluée au dixième pour les enfants et les personnes présentant un terrain allergique.

Posologie usuelle:

- Adulte : 40 gouttes (2 ml) de solution sur une compresse, à chaque application.
- Enfant et personnes présentant un terrain allergique : 4 gouttes de solution diluée dans 2 ml d'eau sur une compresse.

La durée du traitement ne doit pas dépasser une semaine sans avis médical.

CONSEILS

Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Irritation ou sécheresse cutanée en cas d'applications répétées (présence d'alcool).

LEXIQUE

allergie

Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.