VIDAL DE LA FAMILLE

MYCONAIL

Fiche révisée le : 30/01/2023

Antifongique local

ciclopirox

.Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils. Effets indésirables.Lexique

COMPOSITION

	p g
Ciclopirox	80 mg
Alcool cétostéarylique	+

INDICATIONS

Ce médicament est un antifongique d'action locale, actif sur les dermatophytes. Il se présente sous forme de vernis à ongles permettant la diffusion de la substance active à travers l'ongle.
Il est utilisé dans le traitement de certaines infections des ongles dues à des champignons microscopiques (mycoses).

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients de moins de 18 ans (en l'absence d'études).

ATTENTION

Ce médicament est destiné à être utilisé lorsque l'infection ne touche pas plus des trois quart de l'ongle, ni plus de 5 ongles. Si la mycose est plus étendue, un traitement antifongique par voie orale est généralement envisagé.
Bien que ce médicament puisse être acheté sans ordonnance, un avis médical est nécessaire cas de diabète, de déficit immunitaire, de troubles circulatoires dans les mains ou les pieds, d'ongle douloureux ou endommagé, de psoriasis ou d'autre maladie cutanée chronique.
Rincez abondamment en cas de contact accidentel avec les yeux.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Le passage de ce médicament dans le sang après application sur l'ongle est négligeable. Ce vernis peut être utilisé si besoin pendant la grossesse ou l'allaitement.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Ce vernis se rince à l'eau. Il n'est donc pas nécessaire pour l'enlever d'utiliser un dissolvant ou une lime à ongles.
Le ou les ongles infectés doivent être lavés puis séchés soigneusement avant chaque application. Le vernis doit être appliqué sur l'ensemble de l'ongle atteint, sur les 5 mm de peau qui bordent l'ongle, et si possible sous l'ongle. Il sèche en 30 secondes. Il est recommandé de mettre le vernis le soir avant le coucher, les ongles traités ne devant pas être lavés pendant les 6 heures suivant l'application. En cas d'élimination intempestive du vernis, celui-ci peut être appliqué à nouveau.

Posologie usuelle:

- Adulte : 1 application par jour.

La durée du traitement dépend des cas, plusieurs mois en général (environ 6 mois pour les ongles des mains et 9 à 12 mois pour les ongles des orteils). Le traitement peut être arrêté lorsque l'ongle infecté a été totalement éliminé par la repousse de l'ongle sain.

CONSEILS

Il ne faut pas appliquer de vernis ordinaires ou de produits cosmétiques sur les ongles traités.
En cas de lésion importante des ongles des orteils, un meulage préalable par un pédicure facilite l'action du médicament.
Une transpiration excessive contribue au développement des lésions dues à des champignons. Le port de chaussettes en fibre naturelle (coton, laine) est recommandé. La même paire de chaussures ne doit pas être portée deux jours de suite.
Sous l'effet du froid (température inférieure à 15° C), le vernis peut se gélifier. Dans ce cas, il est recommandé de réchauffer le flacon entre les mains jusqu'à ce que le vernis redevienne limpide.
Ce médicament ne doit pas être conservé plus de 6 mois après ouverture du flacon.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Très rares : rougeur, squames, brûlure ou démangeaisons au site d'application.
Fréquence indéterminée : éruption cutanée, eczéma de contact, décolorations passagère de l'ongle (qui peut aussi être due à la mycose elle-même).

LEXIQUE

antifongique
Médicament qui détruit les champignons et levures microscopiques. Ceux-ci peuvent être présents sur la peau ou les muqueuses (tube digestif ou organes génitaux). La levure la plus courante est le Candida albicans.

dermatophytes
Champignon microscopique responsable d'infections cutanées : teigne, pied d'athlète, onyxis (lésion des ongles), etc.

diabète
Terme général désignant les maladies se traduisant par l'émission d'urines abondantes et par une soif intense. Employé seul, le mot diabète concerne généralement le diabète sucré, qui correspond à une perturbation de la régulation des sucres de l'organisme par l'insuline. Il se traduit par l'augmentation du sucre (glucose) dans le sang et par sa présence éventuelle dans les urines. Il existe deux sortes de diabète sucré : le diabète de type 1, ou insulinodépendant, qui nécessite un traitement par l'insuline en injection, et le diabète de type 2, ou non insulinodépendant, qui peut, dans un premier temps, être traité par les antidiabétiques oraux.

mycoses
Affection due à des champignons microscopiques, favorisée par la prise d'antibiotiques.

psoriasis
Maladie de la peau touchant surtout les coudes et les genoux, mais aussi les ongles et le cuir chevelu. Le psoriasis se manifeste par des plaques épaisses, rouges, et recouvertes d'une pellicule blanche adhérente. Le psoriasis peut être plus ou moins inflammatoire. Il se présente parfois sous forme de petits boutons disséminés (psoriasis en gouttes). Le psoriasis peut avoir l'aspect de pustules.