

# VIDAL DE LA FAMILLE

## MYCOSKIN

Fiche révisée le : 05/09/2022

### Antifongique local

**Ce médicament est un générique de MYCOSTER 1 % crème.**

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#)  
[Lexique](#)

## COMPOSITION

	p 100 g
Ciclopirox olamine	1 g
Alcool benzylique	+
Alcool cétylique	+
Alcool stéarylique	+

## INDICATIONS

Cette crème contient un [antifongique](#) d'action locale.  
Elle est utilisée dans le traitement :

- des maladies de la peau dues à certains champignons microscopiques ([mycoses](#)) : [candidose](#), [pityriasis versicolor](#), [dermatophyties](#) (excepté la teigne) ;
- de certaines infections des ongles dues à des champignons microscopiques (onychomycoses) ;
- de la dermatite séborrhéique du visage.

## ATTENTION

N'appliquez pas ce médicament près des yeux.  
Évitez d'utiliser cette crème, notamment chez l'enfant, de manière prolongée et sur des surfaces étendues ou profondément lésées, sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

## GROSSESSE et ALLAITEMENT

En l'absence de données suffisantes, ce médicament est déconseillé pendant la grossesse ou l'allaitement.

## MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

La crème doit être appliquée après lavage et séchage soigneux de la zone à traiter.

**Posologie usuelle:**

1 ou 2 applications par jour. La durée du traitement varie en fonction des indications.

## CONSEILS

En cas de [candidose](#), évitez d'utiliser des savons acides : ils favorisent la multiplication des champignons.

En cas de lésion importante des ongles des orteils, un meulage préalable par un pédicure facilite l'action du médicament.

Une transpiration excessive contribue au développement des lésions dues à des champignons. Le port de chaussettes en fibre naturelle (coton, laine) est recommandé. La même paire de chaussures ne doit pas être portée 2 jours de suite.

## EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Une irritation locale (sensation de brûlure, démangeaisons, rougeur) peut survenir en début de traitement. En revanche, une [allergie](#) cutanée (apparition de petites bulles) doit faire interrompre le traitement : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

---

## LEXIQUE

### ***allergie***

Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.

### ***antifongique***

Médicament qui détruit les champignons et levures microscopiques. Ceux-ci peuvent être présents sur la peau ou les muqueuses (tube digestif ou organes génitaux). La levure la plus courante est le *Candida albicans*.

### ***candidose***

Multiplication anormale d'une levure microscopique, *Candida albicans* le plus souvent. Il s'agit d'une complication fréquente et bénigne des traitements antibiotiques. Les principaux symptômes sont des troubles digestifs, une coloration marron ou noire de la langue, des taches blanches sur le palais ou la langue (muguet), des démangeaisons ou des brûlures de la vulve ou du gland.

### ***dermatophyties***

Infection de la peau ou des ongles par un champignon microscopique (dermatophyte).

### ***mycoses***

Affection due à des champignons microscopiques, favorisée par la prise d'antibiotiques.

### ***pityriasis versicolor***

Infection de la peau due à un champignon microscopique. Elle se manifeste par des taches qui paraissent brunes sur une peau blanche et blanches sur une peau bronzée. Après traitement, seule une exposition au soleil permet de faire disparaître les taches.