VIDAL DE LA FAMILLE

TRANSIPEGLIB

Fiche révisée le : 22/10/2018

Laxatif osmotique

macrogol

Ce médicament est un générique de TRANSIPEG.

.Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils. Effets indésirables.Lexique

COMPOSITION

	p sachet
Macrogol (polyéthylèneglycol) 3350	5,9 g
Sodium	290 mg
Potassium	40 mg
Aspartam	+

INDICATIONS

Ce médicament contient un laxatif osmotique. Il attire l'eau dans l'intestin et augmente le volume des selles.
Il est utilisé dans le traitement symptomatique de la constipation chez l'adulte.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- maladie inflammatoire du côlon (rectocolite hémorragique, maladie de Crohn...),
- occlusion intestinale ou affection prédisposant à une occlusion,
- perforation intestinale ou risque de perforation,
- douleurs abdominales de cause inconnue,
- phénylcétonurie (présence d'aspartam).

ATTENTION

Si la constipation s'accompagne de douleurs abdominales répétitives ou prolongées, de ballonnements importants ou de sang dans les selles, ne prenez pas ce médicament sans avis médical.
Les sachets contiennent du sel (sodium) en quantité notable.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament contient des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas sans l'avis préalable de votre pharmacien ou de votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Le contenu du sachet doit être dilué dans un demi-verre d'eau (100 ml) juste avant la prise.
L'effet laxatif se manifeste 24 à 48 heures après la prise du médicament.

Posologie usuelle:

- Adulte : 1 ou 2 sachets par jour, en une prise, de préférence le matin.

CONSEILS

Le traitement de la constipation repose essentiellement sur des mesures hygiénodiététiques : alimentation riche en fibres, eau de boisson riche en magnésium, activité physique régulière et amélioration de la position sur les toilettes.
Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre pharmacien. En l'absence d'amélioration au bout d'une semaine, consultez votre médecin.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

L'apparition de diarrhée est fréquente, en particulier en cas de dose trop élevée. Il est recommandé d'arrêter le traitement quelques jours et de le reprendre à plus faible dose.
Fréquents : douleurs abdominales, ballonnements.
Très rares : réaction allergique (urticaire, œdème).

LEXIQUE

Crohn
maladie deInflammation de l'intestin, qui peut causer des ulcères et des rétrécissements. Elle devient souvent chronique et peut s'accompagner de diarrhées tenaces et de dénutrition.

laxatif osmotique
Laxatif permettant de rendre les selles plus liquides en retenant l'eau dans le contenu de l'intestin. Il est dénué de toxicité.

œdème
Accumulation d'eau ou de lymphe provoquant un gonflement localisé.

phénylcétonurie
Maladie héréditaire qui se caractérise par l'absence d'une enzyme et qui conduit à l'accumulation dans le sang d'un produit toxique. Son dépistage est systématique à la naissance. Le traitement repose sur un régime alimentaire spécifique pendant la petite enfance.

réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

rectocolite hémorragique
Maladie inflammatoire du rectum et du côlon, qui évolue par poussées. Chaque poussée s'accompagne de fièvre, de selles glaireuses et sanglantes.

sel
Substance chimique dont la plus connue est le chlorure de sodium, ou sel de table. Le sel de régime ne contient pas de sodium ; celui-ci est remplacé généralement par du potassium.

traitement symptomatique
Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.

urticaire
Éruption de boutons sur la peau, dont l'origine est le plus souvent allergique. Les boutons ressemblent à des piqûres d'orties et leur couleur varie du rose pâle au rouge.