VIDAL DE LA FAMILLE

GLYCÉROL/VASELINE/PARAFFINE PIERRE FABRE SANTÉ

Fiche révisée le : 24/03/2022

Protecteur cutané

Ce médicament est un générique de DEXERYL.

.Composition.Indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables. Lexique

COMPOSITION

	p 100 g
Glycérol	15 g
Vaseline	8 g
Paraffine liquide	2 g
Parahydroxybenzoate de propyle	+

INDICATIONS

C'est une crème émolliente et hydratante.
Elle est utilisée dans le traitement d'appoint de la sécheresse de la peau (notamment en cas de dermatite atopique, d'ichtyose ou de psoriasis) et des brûlures superficielles peu étendues.

ATTENTION

Évitez d'appliquer la crème sur des lésions infectées ou sous un pansement occlusif.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Cette crème peut être utilisée pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, elle ne doit pas être appliquée sur la poitrine chez la femme qui allaite.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Appliquer la crème en couche mince.

Posologie usuelle:

1 ou 2 applications par jour.

CONSEILS

Le tube ne doit pas être conservé plus de 6 mois après ouverture. Pensez à noter la date de première utilisation sur la boîte.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Peu fréquents : irritation, rougeur, douleur ou démangeaisons au niveau du site d'application, urticaire, eczéma.
Réaction allergique (présence de parahydroxybenzoate de propyle).

LEXIQUE

Réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

traitement d'appoint
Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.