

VIDAL DE LA FAMILLE

DEXERYLCARE

Protecteur cutané

[.Présentations.](#) [Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p 100 g
Glycérol monostéarate	5 g
Acide stéarique	3 g
Cyclométhicone 5	2,5 g
Diméticone	500 mg
Macrogol 600	500 mg
Trolamine	500 mg
Parahydroxybenzoate de propyle	+

INDICATIONS

C'est une crème émolliente et hydratante.

Elle est utilisée dans le traitement de la sécheresse de la peau associée à certaines affections telle que la dermatite atopique ou l'ichtyose.

ATTENTION

Ce médicament peut être obtenu sans ordonnance, néanmoins l'origine de la sécheresse cutanée doit être diagnostiquée initialement par un médecin.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament ne contient que des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas de façon prolongée sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Appliquer la crème en couche mince.

Posologie usuelle:

2 applications ou plus par jour.

CONSEILS

En l'absence d'amélioration ou en cas d'aggravation après un mois d'utilisation, prenez un avis médical.
Le flacon-pompe ne doit pas être conservé plus de 3 mois après la première utilisation.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Urticaire, démangeaisons, irritation, rougeur.

Rarement : sensation de brûlure ou de picotement, notamment en cas d'application sur une peau lésée.

LEXIQUE