

VIDAL DE LA FAMILLE

DOLOSPASMYL

Fiche révisée le : 15/05/2023

Antispasmodique à visée digestive

alvérine, siméticone

Ce médicament est un générique de MÉTÉOSPASMYL.

[.Présentations.](#) [Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION [\(sommaire\)](#)

	p caps
Alvérine citrate	60 mg
Siméticone	300 mg

INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Ce médicament contient un [antispasmodique](#) et un pansement au silicone. L'antispasmodique relâche les muscles du tube digestif et des [voies biliaires](#) ; le pansement au silicone protège le tube digestif en le couvrant d'un film qui l'isole de son contenu. Il est utilisé dans le [traitement symptomatique](#) des douleurs digestives, notamment avec ballonnement.

ATTENTION [\(sommaire\)](#)

N'utilisez pas ce médicament de façon prolongée sans l'avis de votre médecin : des examens peuvent être nécessaires si les [symptômes](#) persistent.

Conducteur : ce médicament peut être responsable de [vertiges](#).

GROSSESSE et ALLAITEMENT [\(sommaire\)](#)

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu : par mesure de prudence, son usage est déconseillé.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE [\(sommaire\)](#)

Ce médicament doit être pris au début des repas ou au moment des douleurs.

Posologie usuelle:

- Adulte : 1 capsule, 2 ou 3 fois par jour.

CONSEILS [\(sommaire\)](#)

Une alimentation équilibrée, une mastication lente, la suppression des aliments difficiles à digérer et des boissons alcoolisées permettent souvent d'atténuer les troubles de la digestion.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES [\(sommaire\)](#)

Très rares : [réaction allergique](#), atteinte hépatique.

Fréquence indéterminée : vertiges, maux de tête, nausées, éruption cutanée, urticaire, démangeaisons, augmentation des transaminases.

LEXIQUE [\(sommaire\)](#)

antispasmodique

Médicament qui lutte contre les spasmes. Les antispasmodiques agissent généralement en empêchant la contraction de fibres musculaires présentes dans la paroi de l'intestin ou des voies urinaires.

réaction allergique

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

symptômes

Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.

traitement symptomatique

Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.

vertiges

Symptôme qui peut désigner une impression de perte d'équilibre (sens commun) ou, plus strictement, une sensation de rotation sur soi-même ou de l'environnement (sens médical).

voies biliaires

Voies excrétrices conduisant la bile du foie au duodénum. Elles comprennent le canal cholédoque et la vésicule biliaire, réservoir qui stocke la bile en excès entre les repas.

