VIDAL DE LA FAMILLE

CARBOCISTÉINE UPSA

Fiche révisée le : 02/08/2023

Fluidifiant bronchique

Ce médicament est un générique de MUCOPLEXIL.

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

COMPOSITION (sommaire)

	p 15 ml	p sachet
Carbocistéine	750 mg	750 mg
Maltitol	7,5 g	7,5 g
Alcool	1,5 g	1,5 g
Sodium	107 mg	104 mg
Propylène glycol	+	+

INDICATIONS (sommaire)

Ce médicament fluidifie les sécrétions (mucosités) présentes dans les bronches. Il facilite leur évacuation par la toux.
Il est utilisé chez l'adulte en cas de toux grasse avec difficulté à cracher, notamment au cours des bronchites aiguës.

CONTRE-INDICATIONS (sommaire)

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant.

ATTENTION (sommaire)

Ce médicament ne peut être utilisé en cas de bronchite chronique que sur avis médical.
N'utilisez pas d'antitussif en plus de ce médicament sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
En cas de fièvre, de sécrétions qui persistent au-delà de quelques jours ou qui se colorent, consultez votre médecin.
Des précautions sont nécessaires chez la personne âgée, chez les personnes ayant un ulcère de l'estomac ou du duodénum ou en cas

d'association avec un médicament susceptible de provoquer un saignement du tube digestif.
Ce médicament contient de l'alcool ; une dose de 15 ml correspond à 15 ml (1 cuillère à soupe) de vin.

GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. Par prudence, son usage est déconseillé chez la femme enceinte ou chez celle qui allaite.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE (sommaire)

Ce médicament est pris de préférence en dehors des repas.

Posologie usuelle:

- Adulte : 1 godet doseur ou 1 sachet de solution buvable Adulte, 3 fois par jour.

Le traitement peut être interrompu dès l'amélioration des symptômes. Sa durée ne doit pas dépasser 5 jours sans avis médical.

CONSEILS (sommaire)

Fumer, ou être exposé à la fumée des autres, est un frein important à l'évacuation des mucosités.
Il est nécessaire de lutter contre la sécheresse de l'air ambiant (humidificateur...) pour éviter le dessèchement des sécrétions. Il est également recommandé de boire beaucoup.
Chez la personne âgée, l'incapacité à évacuer les crachats peut justifier l'aide d'un kinésithérapeute, sur prescription médicale.
Le flacon ne doit pas être conservé plus de 15 jours après ouverture.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES (sommaire)

Douleurs d'estomac, nausées, diarrhée, pouvant nécessiter une réduction des doses. Saignement du tube digestif nécessitant l'arrêt du traitement.
Réaction allergique cutanée (démangeaisons, éruption cutanée, urticaire...).
Exceptionnellement : éruption cutanée bulleuse potentiellement grave.

LEXIQUE (sommaire)

antitussif
Médicament qui lutte contre la toux. Les antitussifs les plus puissants contiennent de la codéine ou de la codéthyline.

bronchite chronique
Maladie des bronches se traduisant par une toux, des difficultés respiratoires et des mucosités de plus en plus difficiles à évacuer. Ces

troubles, le plus souvent dus au tabac, deviennent définitifs après une certaine période d'évolution.

duodénum
Partie de l'intestin dans laquelle pénètrent les aliments issus de l'estomac.

Réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

ulcère
Lésion en creux de la peau, des muqueuses ou de la cornée.

- Ulcère de jambe : plaie chronique due à une mauvaise circulation du sang.
- Ulcère gastroduodénal : plaie localisée de la muqueuse de l'estomac ou du duodénum, due à un excès d'acidité et très souvent à la présence d'une bactérie (Helicobacter pylori). L'ulcère est favorisé par le stress, l'alcool, le tabagisme et la prise de certains médicaments (aspirine, AINS, etc.).