VIDAL DE LA FAMILLE

TITANORÉÏNE suppositoire

Fiche révisée le : 06/09/2019

Antihémorroïdaire

carraghénates, oxyde de zinc, dioxyde de titane

.Présentations. Composition.Indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

COMPOSITION (sommaire)

	p suppos
Carraghénates	300 mg
Oxyde de zinc	400 mg
Dioxyde de titane	200 mg

INDICATIONS (sommaire)

Ce médicament d'usage local contient des substances protectrices et cicatrisantes.
Il est utilisé dans le traitement des douleurs, des sensations de brûlures et des démangeaisons de l'anus, en particulier au cours des crises d'hémorroïdes.

ATTENTION (sommaire)

Des douleurs, un saignement anal qui persistent malgré le traitement peuvent être dus à une maladie autre que des hémorroïdes et nécessitent un avis médical. De même, tout saignement anal survenant chez une personne de plus de 50 ans doit faire l'objet d'une consultation médicale.

GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE (sommaire)

- Adulte : 1 ou 2 suppositoires par jour.

Le traitement doit être de courte durée (pas plus de 7 jours).

CONSEILS (sommaire)

La constipation chronique et les efforts excessifs de poussée sont les principaux facteurs déclenchants des crises d'hémorroïdes. Un régime riche en fibres alimentaires (fruits, légumes, céréales complètes), des boissons abondantes et un exercice physique régulier en limitent le risque.
En cas de crise, la consommation d'alcool ou de mets épicés peut accentuer les douleurs et la gêne. Une attention particulière doit être portée au nettoyage de la région anale afin de limiter les phénomènes d'irritation. Il est également conseillé de limiter les positions assises prolongées, qui peuvent avoir un effet aggravant sur la douleur.
Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre pharmacien.
Les suppositoires doivent être conservés à l'abri de la chaleur.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES (sommaire)

Démangeaisons, éruption cutanée, réaction allergique.

LEXIQUE (sommaire)

hémorroïdes
Dilatation anormale d'une veine de l'anus ou du rectum se développant soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Elle peut être à l'origine d'un saignement.

réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.