

VIDAL DE LA FAMILLE

LIERRE GRIMPANT VIATRIS CONSEIL

Fiche révisée le : 09/03/2023

Phytothérapie

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#)
[Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p 5 ml
Lierre grim pant, extrait sec de feuille	35 mg
Maltitol liquide	+
Benzoate de sodium	+
Propylène glycol	+

INDICATIONS

Ce sirop contient un extrait de plante à visée expectorante. Son mode d'action n'est pas connu. Il est traditionnellement utilisé pour faciliter l'expectoration en cas de toux grasse.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 2 ans.

ATTENTION

Ce médicament peut être acheté sans ordonnance, sur les conseils de votre pharmacien. Néanmoins, un avis médical est préférable en cas de brûlures d'estomac, d'[ulcère](#) de l'estomac ou du [duodénum](#) ou de toux récurrente.

N'utilisez pas d'[antitussif](#) en plus de ce médicament sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

En cas de fièvre, d'essoufflement ou si les symptômes persistent plus d'une semaine, consultez votre médecin.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Posologie usuelle:

- Adulte et adolescent : 1 gobelet doseur de 7,5 ml de solution buvable, 2 fois par jour.
- Enfant de 6 à 11 ans : 1 gobelet doseur de 5 ml de solution buvable, 2 fois par jour.
- Enfant de 2 à 5 ans : 1 gobelet doseur de 2,5 ml de solution buvable, 2 fois par jour.

La durée du traitement ne doit pas dépasser 7 jours sans avis médical.

CONSEILS

Il est nécessaire de lutter contre la sécheresse de l'air ambiant (humidificateur...) pour éviter le dessèchement des sécrétions. Il est également recommandé de boire beaucoup.

Fumer, ou être exposé à la fumée des autres, est un frein important à l'évacuation des mucosités.

La solution ne doit pas être conservée plus de 14 jours après ouverture du flacon ; pensez à noter la date de première utilisation sur l'emballage.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Nausée, vomissements, diarrhée.

[Réaction allergique.](#)

LEXIQUE

antitussif

Médicament qui lutte contre la toux. Les antitussifs les plus puissants contiennent de la codéine ou de la codéthylène.

duodénum

Partie de l'intestin dans laquelle pénètrent les aliments issus de l'estomac.

Réaction allergique

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

ulcère

Lésion en creux de la peau, des muqueuses ou de la cornée.

- Ulcère de jambe : plaie chronique due à une mauvaise circulation du sang.
- Ulcère gastroduodénal : plaie localisée de la muqueuse de l'estomac ou du duodénum, due à un excès d'acidité et très souvent à la présence d'une bactérie (*Helicobacter pylori*). L'ulcère est favorisé par le stress, l'alcool, le tabagisme et la prise de certains médicaments (aspirine, AINS, etc.).