

# VIDAL DE LA FAMILLE

## CHLORHEXIDINE MYLAN

Fiche révisée le : 17/02/2020

### Bain de bouche antiseptique

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Interactions médicamenteuses.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#)  
[Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

## COMPOSITION

	p 100 ml
Chlorhexidine digluconate	120 mg
Azorubine	+
Propylèneglycol	+

## INDICATIONS

Cette solution pour [bain de bouche](#) contient un [antiseptique](#).  
Elle est utilisée dans le [traitement d'appoint](#) des infections de la bouche ou après une opération des gencives ou des dents.

## ATTENTION

Le [bain de bouche](#) n'est pas facilement utilisable chez le jeune enfant qui risque d'avaler la solution, c'est pourquoi il est destiné à l'enfant de plus de 6 ans.  
L'usage prolongé des traitements antiseptiques locaux ([gargarisme](#), [collutoire](#), pastille) n'est pas souhaitable ; il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la gorge.  
En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours, consultez votre médecin.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Il est généralement inutile d'associer des [antiseptiques](#) différents. Ceux-ci peuvent être contenus dans de nombreux produits disponibles en automédication : pastille, [collutoire](#) et solution nasale ; demandez conseil à votre pharmacien.

## GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

## MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

La solution doit être utilisée pure, après le brossage des dents.

Pour chaque [bain de bouche](#), utiliser un gobelet doseur rempli jusqu'au trait. La solution est gardée dans la bouche 1 minute environ avant d'être recrachée. Elle ne doit pas être avalée.

#### **Posologie usuelle:**

- Adulte et enfant de plus de 6 ans : 1 à 3 bains de bouche par jour.

## **CONSEILS**

Évitez de manger ou de boire dans l'heure qui suit le [bain de bouche](#).

Certains dentistes et stomatologistes recommandent de ne pas pratiquer de bains de bouche dans les heures qui suivent une extraction dentaire, afin d'éviter de faire saigner la plaie.

La solution ne doit pas être conservée plus de 30 jours après ouverture du flacon.

## **EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES**

En traitement prolongé : coloration brune de la langue et des dents disparaissant à l'arrêt du traitement.

Modification du goût, sensation de brûlure de la langue.

[Réaction allergique](#) locale nécessitant l'arrêt du traitement.

---

## **LEXIQUE**

### ***antiseptique***

Substance qui détruit localement les bactéries, réduisant leur nombre et empêchant leur prolifération. Certains antiseptiques sont également actifs sur les champignons microscopiques et les virus.

### ***bain de bouche***

Mode de traitement local qui consiste à laisser au contact de lésions de la bouche ou des gencives un médicament pur ou dilué dans de l'eau froide ou tiède.

### ***collutoire***

Médicament qui agit par contact sur l'arrière-gorge et les parois internes de la bouche. Il est administré par pulvérisation ou en badigeon.

### ***gargarisme***

Mode de traitement local qui vise à laisser au contact de l'arrière-gorge un médicament pur ou dilué dans de l'eau froide ou tiède. Il se pratique la tête penchée en arrière, une expiration continue empêchant le liquide de descendre dans les poumons. La solution utilisée ne doit pas être avalée.

### ***Réaction allergique***

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

### ***traitement d'appoint***

Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.