

VIDAL DE LA FAMILLE

UNIFLUID

Suppléance lacrymale

povidone

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Interactions médicamenteuses.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#)
[Conseils.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p unidose
Povidone	6 mg

INDICATIONS

C'est une solution de suppléance lacrymale : elle compense une insuffisance de sécrétion naturelle de larmes. Elle est utilisée dans le traitement de la sécheresse oculaire due à une insuffisance lacrymale (œil sec).

ATTENTION

Une irritation oculaire peut être due à une infection : en cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin. N'utilisez pas ce collyre de façon prolongée sans prendre un avis médical.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce collyre peut interagir avec d'autres collyres : respectez un intervalle de 15 minutes entre deux instillations.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'utilisation ponctuelle de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement ne semble pas poser de problème particulier.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Utiliser un nouveau flacon unidose lors de chaque instillation.

Tirer la paupière inférieure vers le bas tout en regardant vers le haut et déposer les gouttes entre la paupière et le globe oculaire ([cul-de-sac conjonctival](#)).

Posologie usuelle:

2 gouttes, 4 à 6 fois par jour.

CONSEILS

L'application correcte du produit peut nécessiter une aide, notamment chez une personne handicapée ou âgée.
Les flacons unidoses ne contiennent pas de conservateur ; ne les conservez pas après ouverture.

LEXIQUE

cul-de-sac conjonctival

Espace formé lorsqu'on tire vers le bas la paupière inférieure, qui se décolle de l'œil et forme une cavité. C'est dans celle-ci que doivent être déposées les gouttes de collyre et les pommades ophtalmiques. Le médicament se répartit naturellement sur la totalité de l'œil. Il sera éliminé, comme les larmes, par le canal lacrymal, qui évacue les larmes vers le nez.