

VIDAL DE LA FAMILLE

CANEPHRON

Fiche révisée le : 19/11/2021

Phytothérapie

petite centaurée, vilèche, romarin

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#)
[Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p cp
Petite centaurée, poudre de partie aérienne fleurie	36 mg
Livèche, poudre de racine	36 mg
Romarin, poudre de feuille	36 mg
Saccharose	120 mg
Lactose	+

INDICATIONS

Ce médicament contient des extraits de plantes.

Il est traditionnellement utilisé, en complément des mesures hygiéno-diététiques, pour favoriser l'élimination d'eau par les reins en cas de troubles urinaires bénins.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- allergie aux plantes de la famille des Apiacées (Ombellifères comprenant l'anis et le fenouil), ou à l'anéthol,
- ulcère gastro-duodénal,
- rétention d'eau liée à une [insuffisance cardiaque](#) ou à une [insuffisance rénale](#).

ATTENTION

En cas de fièvre persistante, de douleur dans le bas ventre, de spasmes, de sang dans l'urine, prenez rapidement l'avis de votre médecin.

Si les symptômes persistent ou s'aggravent après 3 jours de traitement, un avis médical est nécessaire.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Grossesse :

Par mesure de prudence, n'utilisez pas ce médicament pendant la grossesse sans prendre l'avis de votre médecin.

Allaitement :

Les données disponibles ne permettent pas de savoir si ce médicament passe dans le lait maternel. Il est déconseillé pendant l'allaitement.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Les comprimés doivent être avalés sans être croqués avec un verre d'eau.

Posologie usuelle:

- Adulte et adolescent de plus de 12 ans : 1 comprimé, 3 fois par jour.

CONSEILS

Il est recommandé de boire suffisamment en cas de troubles urinaires.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Fréquents : troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhée).

Réaction allergique nécessitant l'arrêt du traitement.

LEXIQUE***insuffisance cardiaque***

Incapacité du cœur à remplir sa fonction de pompe. Les principaux symptômes de l'insuffisance cardiaque sont une fatigue et un essoufflement lors d'un effort.

insuffisance rénale

Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.