VIDAL DE LA FAMILLE

CÉRULYSE

Fiche révisée le : 30/05/2022

Céruménolytique

xylène

.Composition.Indications.Contre-indications.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

COMPOSITION

	p 100 g
Xylène	5 g

INDICATIONS

Ce médicament est une solution auriculaire huileuse utilisée pour dissoudre les bouchons de cérumen.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de perforation du tympan.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Réchauffer le flacon entre les mains avant l'emploi pour limiter la sensation désagréable liée à l'introduction d'un liquide froid dans l'oreille.
Pencher la tête sur le côté et introduire la solution dans l'oreille. Garder la tête dans cette position pendant 10 minutes (bain d'oreille).

Posologie usuelle:

- Bouchons mous : faire un bain d'oreille avec quelques gouttes de solution avant de rincer l'oreille.
- Bouchons durs : faire un bain d'oreille avec quelques gouttes de solution, 3 fois par jour, pendant les 3 ou 4 jours qui précèdent la consultation chez le médecin.

CONSEILS

Dans le cas d'un bouchon mou, le lavage de l'oreille pour évacuer le cérumen peut être fait à l'aide d'une poire auriculaire contenant de l'eau tiède ou d'une solution adaptée. Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Lorsque les dépôts de cérumen durcissent après quelques mois, leur extraction doit généralement être réalisée par un médecin. La dissolution préalable du bouchon par cette solution facilitera son extraction et rendra celle-ci moins pénible. Après le bain d'oreille, il est normal de ressentir une sensation d'oreille bouchée, car il reste fréquemment un peu de solution entre le bouchon de cérumen et le tympan.
La solution est huileuse : elle peut tacher les vêtements. Il peut être nécessaire de pencher la tête sur un coton après le bain d'oreille pour absorber l'excédent de solution.
Ce médicament ne doit pas être conservé plus de 30 jours après une première utilisation.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Irritation locale, allergie.

LEXIQUE