

VIDAL DE LA FAMILLE

ARCALION

Fiche révisée le : 30/11/2010

Psychostimulant

sulbutiamine

[.Présentations.](#) [Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION [\(sommaire\)](#)

	p cp
Sulbutiamine	200 mg
Lactose	+

INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

C'est un médicament qui appartient à la famille des [psychostimulants](#).
Il est utilisé dans les états d'apathie, d'abattement, de manque d'énergie.

ATTENTION [\(sommaire\)](#)

L'apathie, l'abattement peuvent être les seuls [symptômes](#) d'une [dépression](#) qui nécessite un traitement spécifique : consultez votre médecin.

GROSSESSE et ALLAITEMENT [\(sommaire\)](#)

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE [\(sommaire\)](#)

Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau au cours des repas du matin et du midi.

Posologie usuelle:

- Adulte : 2 ou 3 comprimés par jour.

La durée du traitement ne doit pas dépasser 4 semaines sans avis médical.

CONSEILS [\(sommaire\)](#)

Une fatigue persistante ne doit pas vous conduire à augmenter ou prolonger les prises de ce médicament ; consultez votre médecin.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES [\(sommaire\)](#)

Tremblements, maux de tête, agitation, malaise, [réaction allergique](#) cutanée, [intolérance](#) digestive.

LEXIQUE [\(sommaire\)](#)

dépression

Maladie associant le plus souvent un sentiment de fatigue, d'inutilité, de culpabilité, d'incapacité à accomplir les tâches quotidiennes. Une perte d'appétit et des troubles du sommeil sont fréquents. Les pulsions suicidaires sont l'un des signes de gravité de la dépression.

intolérance

Effet indésirable, le plus souvent digestif, lors de la prise d'un médicament. L'irritation de l'estomac due à l'aspirine est une intolérance et non une allergie.

psychostimulants

Médicament qui stimule l'attention et la vigilance.

réaction allergique

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

symptômes

Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.