

VIDAL DE LA FAMILLE

ELUDRILPRO

Fiche révisée le : 30/08/2022

Bain de bouche antiseptique

chlorhexidine, chlorobutanol

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Interactions médicamenteuses.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p 100 ml
Chlorhexidine digluconate solution	0,5 ml
Chlorobutanol hémihydrate	0,5 g
Alcool	36 g
Rouge cochenille A	+

INDICATIONS

Cette solution pour [bain de bouche](#) contient des [antiseptiques](#).

Elle est utilisée dans le [traitement d'appoint](#) des affections de la bouche ou après une opération des dents ou des gencives.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 6 ans.

ATTENTION

L'usage prolongé des traitements antiseptiques locaux ([gargarisme](#), [collutoire](#), pastille) n'est pas souhaitable ; il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la gorge.

En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours, en cas d'apparition de fièvre, consultez votre médecin ou votre chirurgien-dentiste.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Il est généralement inutile d'associer des [antiseptiques](#) différents. Ceux-ci peuvent être contenus dans de nombreux produits disponibles en automédication : pastille, [collutoire](#) et solution nasale ; demandez conseil à votre pharmacien.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est

individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Se laver les dents et se rincer soigneusement la bouche avec de l'eau avant utilisation.
Verser 10 à 15 ml dans le gobelet doseur et compléter avec de l'eau tiède jusqu'au trait supérieur. Utiliser en [bain de bouche](#) la totalité du contenu du gobelet doseur. Conserver la solution en bouche 1 minute avant de la recracher.
La solution ne doit pas être avalée.

Posologie usuelle:

- Adulte et enfant de plus de 6 ans : 1 bain de bouche, 2 ou 3 fois par jour.

La durée du traitement ne doit pas dépasser 2 semaines sans l'avis de votre médecin ou de votre dentiste.

CONSEILS

Il est généralement conseillé de ne pas s'alimenter ou de ne pas boire immédiatement après un [bain de bouche](#), afin de permettre aux substances actives d'agir.
Certains dentistes et stomatologistes recommandent de ne pas pratiquer de bain de bouche dans les heures qui suivent une extraction dentaire, afin d'éviter de faire saigner la plaie.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Réaction allergique grave à la chlorexidine pouvant entraîner un choc anaphylactique.
Trouble du goût, sensation de brûlure de la langue, gonflement des glandes salivaires.
Coloration brune de la langue et des dents disparaissant à l'arrêt du traitement.

LEXIQUE

antiseptiques

Substance qui détruit localement les bactéries, réduisant leur nombre et empêchant leur prolifération. Certains antiseptiques sont également actifs sur les champignons microscopiques et les virus.

bain de bouche

Mode de traitement local qui consiste à laisser au contact de lésions de la bouche ou des gencives un médicament pur ou dilué dans de l'eau froide ou tiède.

collutoire

Médicament qui agit par contact sur l'arrière-gorge et les parois internes de la bouche. Il est administré par pulvérisation ou en badigeon.

gargarisme

Mode de traitement local qui vise à laisser au contact de l'arrière-gorge un médicament pur ou dilué dans de l'eau froide ou tiède. Il se pratique la tête penchée en arrière, une expiration continue empêchant le liquide de descendre dans les poumons. La solution utilisée ne doit pas être avalée.

traitement d'appoint

Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.