

VIDAL DE LA FAMILLE

SULFARLEM

Fiche révisée le : 22/12/2006

Correcteur des insuffisances salivaires

anétholtrithione

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p cp
Anétholtrithione	12,5 mg

INDICATIONS

Ce médicament est destiné à augmenter la sécrétion de la bile et de la salive. Il est utilisé pour traiter les digestions difficiles et la sécheresse de la bouche.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'obstruction des [voies biliaires](#) (calculs).

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Ce médicament n'est pas destiné à l'enfant de moins de 6 ans. Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau, une demi-heure avant les repas.

Posologie usuelle:

- Adulte : 1 ou 2 comprimés, 3 fois par jour.
- Enfant de 10 à 15 ans : 1 comprimé, 3 fois par jour.
- Enfant de 6 à 10 ans : 1 comprimé, 2 fois par jour.

CONSEILS

Une alimentation équilibrée, une mastication lente, la suppression des aliments difficiles à digérer et des boissons alcoolisées

permettent souvent d'atténuer les troubles de la digestion.
La coloration plus foncée des urines est normale lors de la prise de ce médicament.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Selles molles pouvant aller jusqu'à la diarrhée.

LEXIQUE

voies biliaires

Voies excrétrices conduisant la bile du foie au duodénum. Elles comprennent le canal cholédoque et la vésicule biliaire, réservoir qui stocke la bile en excès entre les repas.