

VIDAL DE LA FAMILLE

TANGANIL

Fiche révisée le : 28/02/2014

Antivertigineux

acétylleucine

TANGANIL Gé comprimé :

Ce médicament est un générique de TANGANILPRO (nouvelle dénomination de TANGANIL 500 mg comprimé).

[Composition](#) . [Indications](#) . [Contre-indications](#) . [Attention](#) . [Grossesse et allaitement](#) . [Mode d'emploi et posologie](#) . [Conseils](#) .
[Effets indésirables](#) . [Lexique](#)

COMPOSITION

	p cp	p amp inj
Acétylleucine	500 mg	500 mg
Amidon de blé	+	

INDICATIONS

Ce médicament est un antivertigineux, dont le mécanisme d'action n'est pas connu.
Il est utilisé dans le [traitement symptomatique](#) de la crise de [vertiges](#).

CONTRE-INDICATIONS

Les comprimés ne doivent pas être utilisés en cas d'allergie au [gluten](#), autre que la [maladie coeliaque](#) (présence d'amidon de blé).

ATTENTION

Ce médicament est destiné au traitement des [vertiges](#) et non des troubles de l'équilibre : parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Les comprimés peuvent être avalés avec un peu d'eau, au moment des repas.
La solution injectable est administrée par [voie](#) intraveineuse lente.

Posologie usuelle:

- Adulte : 3 ou 4 comprimés par jour à répartir en 2 prises, ou 2 ampoules par jour.

CONSEILS

Les comprimés sont inadaptés en cas de [vertiges](#) graves accompagnés de vomissements ; il sera alors préférable d'utiliser la solution injectable.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Éruption cutanée, [urticaire](#).

LEXIQUE***gluten***

Constituant de certaines céréales (blé, avoine, orge, seigle) et de la farine, qui peut donner lieu chez de très rares personnes prédisposées à une intolérance digestive grave.

Le maïs et le riz ne contiennent pas de gluten.

maladie coeliaque

Maladie du nourrisson et du jeune enfant liée à une intolérance au gluten contenu notamment dans la farine (pain, pâtes, etc.). Elle débute par une diarrhée aiguë avec des selles graisseuses. En l'absence de régime, elle risque d'évoluer vers une anémie, un retard de croissance et un retard mental. La guérison est fréquente à 6 ou 7 ans. Elle nécessite d'exclure le gluten du régime alimentaire.

traitement symptomatique

Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.

urticaire

Éruption de boutons sur la peau, dont l'origine est le plus souvent allergique. Les boutons ressemblent à des piqûres d'orties et leur couleur varie du rose pâle au rouge.

vertiges

Symptôme qui peut désigner une impression de perte d'équilibre (sens commun) ou, plus strictement, une sensation de rotation sur soi-même ou de l'environnement (sens médical).

voie

- Chemin (voie d'administration) utilisé pour administrer les médicaments : voie orale, sublinguale, sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, intradermique, transdermique.
- Ensemble d'organes creux permettant le passage de l'air (voies respiratoires), des aliments (voies digestives), des urines (voies urinaires), de la bile (voies biliaires), etc.