VIDAL DE LA FAMILLE

ATÉPADÈNE

Fiche révisée le : 16/01/2020

Myorelaxant

adénosine triphosphate

.Composition.Indications.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

COMPOSITION

	p gél
Adénosine triphosphate	30 mg
Azorubine (E122)	+

INDICATIONS

Ce médicament contient de l'adénosine triphosphate, une substance qui intervient dans le métabolisme des muscles.
Il est utilisé dans le traitement d'appoint des dorsalgies.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Les gélules doivent être avalées avec un verre d'eau.

Posologie usuelle:

2 ou 3 gélules par jour.

CONSEILS

Le mal de dos peut être prévenu par l'apprentissage d'une posture correcte, et éventuellement une perte de poids et des exercices physiques réguliers permettant de muscler le dos.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Très rare : réaction allergique cutanée.

LEXIQUE

dorsalgies
Douleur du dos.

métabolisme
Ensemble des actions de transformation qu'effectue l'organisme, aboutissant à la création d'énergie ou à l'élaboration de substances diverses. On distingue l'anabolisme (métabolisme de fabrication) du catabolisme (métabolisme de dégradation).

réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

traitement d'appoint
Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.