

VIDAL DE LA FAMILLE

BÉBÉGEL

Fiche révisée le : 09/04/2013

Laxatif par voie rectale

glycérol

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#)
[Lexique](#)

COMPOSITION

| | p unidose |
|----------|-----------|
| Glycérol | 3,9 g |

INDICATIONS

C'est un laxatif administré par [voie](#) rectale. Il déclenche une contraction du rectum qui permet l'évacuation des selles. Il est utilisé dans le traitement de la constipation, notamment lorsque les selles s'accumulent dans le rectum et que les poussées répétées ne permettent pas de les évacuer. Il est également utilisé pour préparer le rectum avant un examen endoscopique (rectoscopie).

ATTENTION

Les laxatifs administrés par [voie](#) rectale ne doivent pas être utilisés de façon prolongée sans avis médical : ils risquent d'empêcher le réflexe normal d'expulsion des selles.

Des précautions sont nécessaires chez la personne atteinte d'[hémorroïdes](#), de [fissure anale](#) ou de [rectocolite hémorragique](#).

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament peut être utilisé de façon ponctuelle pour traiter la constipation de la femme enceinte ou qui allaite.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Enlever le capuchon, introduire la canule dans le rectum et vider le contenu du récipient unidose par pression. La canule peut être lubrifiée pour en faciliter l'introduction.

L'unidose doit être administrée 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour la selle.

Posologie usuelle:

- Adulte et enfant de plus de 6 ans : 1 unidose, à renouveler 1 heure après en cas de constipation rebelle.
- Enfant de 2 à 6 ans : 1 unidose par jour.
- Nourrisson : 1 unidose par jour, 2 jours sur 3.

CONSEILS

Le traitement de la constipation repose essentiellement sur des mesures hygiéno-diététiques : alimentation riche en fibres, eau de boisson riche en magnésium, activité physique régulière et amélioration de la position sur les toilettes.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Un usage prolongé peut occasionner des sensations de brûlure anale et exceptionnellement des [inflammations](#) du rectum.

LEXIQUE

fissure anale

Petite crevasse du pourtour de l'anus, souvent peu ou pas visible, provoquant des douleurs vives pendant et après la selle.

hémorroïdes

Dilatation anormale d'une veine de l'anus ou du rectum se développant soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Elle peut être à l'origine d'un saignement.

inflammations

Réaction naturelle de l'organisme contre un élément reconnu comme étranger. Elle se manifeste localement par une rougeur, une chaleur, une douleur ou un gonflement.

rectocolite hémorragique

Maladie inflammatoire du rectum et du côlon, qui évolue par poussées. Chaque poussée s'accompagne de fièvre, de selles glaireuses et sanglantes.

voie

- Chemin (voie d'administration) utilisé pour administrer les médicaments : voie orale, sublinguale, sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, intradermique, transdermique.
- Ensemble d'organes creux permettant le passage de l'air (voies respiratoires), des aliments (voies digestives), des urines (voies urinaires), de la bile (voies biliaires), etc.