VIDAL DE LA FAMILLE

CARBOSYLANE

Fiche révisée le : 15/09/2017

Adsorbant intestinal

charbon, siméticone

.<u>Composition</u>.<u>Indications</u>.<u>Attention</u>.<u>Interactions médicamenteuses</u>.<u>Grossesse et allaitement</u>.<u>Mode d'emploi et posologie</u>. Conseils.Effets indésirables.Lexique

COMPOSITION

	p gél bleue	p gél rouge
Charbon activé	140 mg	140 mg
Siméticone	45 mg	45 mg

	p gél bleue Enf	p gél rouge Enf
Charbon activé	70 mg	70 mg
Siméticone	22,5 mg	22,5 mg

INDICATIONS

Ce médicament contient du charbon activé et un <u>pansement digestif</u> au silicone, qui protègent le tube digestif et combattent la production de gaz.

Il est utilisé dans le traitement symptomatique des ballonnements et des digestions difficiles.

ATTENTION

N'utilisez pas ce médicament de façon prolongée sans l'avis de votre médecin : des examens peuvent être nécessaires si les symptômes persistent.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut diminuer l'absorption d'autres médicaments, en particulier ceux qui contiennent de la digitoxine ou de la digoxine (
<u>digitaliques</u>). Un délai d'au moins 2 heures doit être respecté entre la prise de ce médicament et celle des autres traitements. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament ne contient que des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Une dose comprend une gélule bleue et une gélule rouge. Les gélules doivent être avalées ensemble avec un peu d'eau, avant ou après les principaux repas.

Les gélules ne sont pas adaptées à l'enfant de moins de 6 ans. En effet, elles risquent d'obstruer les voies respiratoires si l'enfant déglutit mal et que la gélule passe dans la trachée (fausse route).

Posologie usuelle:

- Adulte: 1 dose CARBOSYLANE, 3 fois par jour.
- Enfant de 10 à 15 ans : 1 dose CARBOSYLANE Enfant, 3 fois par jour.
- Enfant de 6 à 10 ans : 1 dose CARBOSYLANE Enfant, 2 fois par jour.

CONSEILS

Une alimentation riche en fibres, si elle facilite le transit, peut également augmenter les fermentations intestinales et favoriser les ballonnements. Demandez conseil à votre médecin pour équilibrer votre alimentation.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Selles de coloration noire.

Réaction allergique.

LEXIQUE

digitaliques

Famille de médicaments apparentés à la digitaline, substance issue de la digitale pourpre (plante commune). Les digitaliques, utilisés en cardiologie, ralentissent le cœur et renforcent ses contractions.

gastrorésistante

Qualifie certains comprimés ou gélules dans lesquels la substance active est protégée de l'acidité de l'estomac.

pansement digestif

Médicament qui protège le tube digestif en tapissant la muqueuse d'un film protecteur et en diminuant l'acidité de l'estomac. Ce type de médicament peut gêner l'absorption d'autres médicaments.

Réaction allergique

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

symptômes

Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.

traitement symptomatique

Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.