VIDAL DE LA FAMILLE

COMBANTRIN

Fiche révisée le : 19/12/2002

Antihelminthique

pyrantel

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#)
[Lexique](#)

COMPOSITION

	p cp	p c mes
Pyrantel	125 mg	250 mg

INDICATIONS

Ce médicament est un vermifuge, actif sur certains vers parasites de l'intestin. Il paralyse les vers à l'intérieur du tube digestif, permettant ainsi leur élimination.

Il est utilisé pour éliminer les oxyures, les ascaris ou les [ankylostomes](#).

ATTENTION

Des précautions sont nécessaires en cas d'[insuffisance hépatique](#).

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Ce médicament peut être pris à n'importe quel moment de la journée.

Les comprimés ne sont pas adaptés à l'enfant de moins de 6 ans. En effet, ils risquent d'obstruer les voies respiratoires si l'enfant déglutit mal et que le comprimé passe dans la trachée (fausse route).

La suspension buvable est particulièrement adaptée aux enfants.

Posologie usuelle:

En cas d'oxyures ou d'ascaris : une seule prise, à renouveler au bout de 15 à 20 jours pour éviter une réinfestation par les œufs qui ne sont pas détruits par le médicament.

- Adulte de plus de 75 kg : 8 comprimés ou 4 cuillères-mesure (5 ml) de solution buvable, en une seule prise.
- Adulte de moins de 75 kg : 6 comprimés ou 3 cuillères-mesure (5 ml) de solution buvable, en une seule prise.

- Enfant de plus de 12 kg : 10 à 12 mg/kg en une seule prise (2,5 ml) ; soit environ 1 comprimé ou ½ cuillère-mesure par 10 kg de poids, en une seule prise.

En cas d'[ankylostomiase](#) : la posologie est fonction de la gravité de l'infestation. En cas d'infestation grave, 20 mg par kg et par jour pendant 2 ou 3 jours.

- Adulte de plus de 75 kg : 16 comprimés ou 8 cuillères-mesure de solution buvable.
- Adulte de moins de 75 kg : 12 comprimés ou 6 cuillères-mesure de solution buvable.
- Enfant : 2 comprimés ou 1 cuillère-mesure de solution buvable par 10 kg de poids.

Dans les cas moins graves, une prise de 10 mg par kg est suffisante.

CONSEILS

Les oxyures se transmettant par les mains, pour éviter la réinfestation, il est recommandé :

- de se laver les mains et de se brosser les ongles plusieurs fois par jour,
- de couper très court les ongles des enfants,
- de traiter tous les membres de la famille en même temps car il est fréquent que l'infestation ne donne aucun [symptôme](#).

Pour éviter l'infestation par les ascaris, laver les fruits et les légumes.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Rarement : [troubles digestifs](#), notamment douleurs abdominales, nausées ou diarrhée.

Exceptionnellement : maux de tête, [vertiges](#), somnolence ou insomnie.

LEXIQUE

ankylostomes

Parasite digestif proche de l'anguillule, dont les larves pénètrent à travers la peau.

ankylostomiase

Infection due aux ankylostomes. Elle est responsable d'une anémie.

Synonyme : ankylostomose.

insuffisance hépatique

Incapacité du foie à remplir sa fonction, qui est essentiellement l'élimination de certains déchets, mais également la synthèse de nombreuses substances biologiques indispensables à l'organisme : albumine, cholestérol et facteurs de la coagulation (vitamine K, etc.).

symptôme

Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.

troubles digestifs

Ensemble de symptômes traduisant une irritation ou un mauvais fonctionnement du tube digestif. Un ou plusieurs troubles peuvent être présents : nausées, vomissements, aérophagie, douleurs abdominales, brûlures d'estomac, ballonnements, flatulences, diarrhée ou constipation, etc. Les antibiotiques peuvent favoriser les candidoses, souvent responsables de troubles digestifs.

vertiges

Symptôme qui peut désigner une impression de perte d'équilibre (sens commun) ou, plus strictement, une sensation de rotation sur soi-même ou de l'environnement (sens médical).